

卵させようとしたが、失敗した。

3卵は現在越冬蛹となっている。

従って自宅附近のカラタチで見られるパピリオは、上記3種にクロアゲハ、ナミアゲハを加えて5種となる。

4. ミヤマカラスアゲハ

自然状態において普通にみられるのはキハダがほとんどであるが、須磨鉢伏山に於てモンキアゲハ、カラスアゲハに混って、たまに幼虫がカラスザンショウで発見され、また能勢妙見山ではカラスザンショウで発生しているが、筆者は能勢初谷でコクサギより3令幼虫を得ている(1970~1974)。

5. オナガアゲハ

能勢初谷などではほとんどコクサギについているが、1981年10月に川西市笹部でイヌザンショウより3令幼虫2頭を得た。飼育はユズ、ダイダイ、サンショウ、カラタチなどを普通に食し、現在1蛹が越冬中である(1頭は寄生)。

6. クロアゲハ

文献等では、まれにコクサギで発生するとあるが、カラタチより得た3~5令幼虫にコクサギを与えても、かじるだけであまり食さなかった。

7. ナガサキアゲハ

最近、西宮市、芦屋市、神戸市などで人家のダイダイ、ミカン、ユズなどで発生しているが、筆者はまだ神戸に於いて発生源をつきとめておらず、飛翔中の1♂を目撃したのみである。

(神戸市垂水区東舞子町18-61-205号)

能勢のトンボ3種

仲田元亮

近頃は、めについたトンボを採ってかえることにしています。種類は、まだまだといったところですが、その中から3種だけひらいてみました。

○ ムカシトンボ *Epiophlebia superstes*

1981 5 5, 兵庫県猪名川町杉生新田, lex.

- グンバイトンボ *Platycnemis foliacea sasakii*
 - 1981 7 5, 兵庫県川西市笹部(初谷川附近), 2exs.
 - 1981 7 12, 兵庫県川西市笹部(初谷川附近), 1ex.
 - 1981 7 15, 兵庫県川西市笹部(初谷川) 多数をみる。
 - 1981 7 26, 兵庫県川西市笹部(初谷川) 多数をみる。
- ハツチョウトンボ *Nannophya pygmaea*
 - 1979 7 8, 兵庫県猪名川町杉生新田, 4exs.
 - 1979 7 21, 兵庫県猪名川町杉生新田, 4exs.
 - 1979 7 27, 兵庫県猪名川町杉生新田, 4exs.
 - 1980 8 9, 兵庫県猪名川町杉生新田, ♀ 1ex.

甲山湿源のネアカヨシヤンマ

田 中 稔

1980年8月23日西宮市甲山湿源にてネアカヨシヤンマ *Aeschnophlebia anisoptera* の産卵を観察したので報告する。雨の上った午後3時頃、湿源内に本種の♀が飛来した。始め1m程の高さを飛びながら産卵場所を捜していたがやがて、バサバサと羽音をたててわずかに水がしみ出ているコケ、粘土状の土にとまり10秒程産卵をして飛び立った所を採集した。30分程の合計4♀が飛来して同じ様な所に産卵をした。ハツチョウトンボが多い水の少ない所に、本種の産卵は意外な気がした。

宝塚市清荒神のチョウ(追録)

加 藤 信一郎

1981年10月4日正午、メスグロヒョウモン *Damora sagana ilona* Fruhstorfer 1♀を採集したので報告する。採集場所は自宅裏の小さい池沿いの小道で、低木の間を縫うように緩やかに飛んでいた。夏眠後の採品なので後翅端が若干欠けているが、鱗粉の脱落はさほど目立たない。

メスグロヒョウモンはヒョウモン類としてはそれほど珍しいものではないが、どこでも普通に見られ