

三室山のカミキリムシ


畑中 熙

兵庫県高砂市曾根町 2639. 3-203

兵庫県北西部に扇山、氷山があり、更にその南に戸倉峠を越えて三室山がある。この一帯には三室山(1358m)を中心に1000m級の三角点が集んでいす。この山の山麓には音水溪谷、赤西溪谷があり、その入口に原の部落がある。著者は三室山群のカミキリ相を知るために音水・赤西両原生林を中心に採集調査を行った。ここに、この山までの調査結果として著者の採集データを記しておく。

同定は大部分は北隆館の原色昆虫大図鑑によるが、一部は辻啓介氏に依頼した。同氏に厚く御礼申し上げる。種名及び排列順序は小島圭三・林匡夫著原色日本昆虫生態図鑑1のカミキリ編に従った。

音水・赤西原生林は毎年伐採され、年毎にその様子に変化していき。その変化の過程に昭和47年夏の原生林の残存状態を示して



ぶく。但し、音水溪谷への同様に付行かた  
 の下のでこの様子は不明である。伐採に  
 従事してゐる人の話によれば、音水溪谷は冬  
 期の降雪が多くて伐採作業が出来ない。雪  
 のない時期に作業を行ふ、冬期には赤西原  
 生林を伐採するのと同じである。しかし  
 12月数年内に原生林は無くするようた。

I. ホソカミキリ 亜科 Disteniinae

ホソカミキリ 族 Disteniini

1. ホソカミキリ *Distenia gracilis* (Flessig)

赤西 (1 ex., 30. III. '72.; 1 ex., 31. VII. '72); 夕方・早朝に飛来。

II. ハナカミキリ 亜科 Lepturinae

カクビロハナカミキリ 族 Toxotini

2. カウカネハナカミキリ *Gaurotes doris* Bates

赤西 (1 ex., 28. V. '72. トチノ花上; 1 ex., 25. VI. '72. 木上)

3. アカヒメセイルシハナカミキリ *Lemula nishimurai* Seki

赤西 (2 exs., 10. V. '70. カエデ花上; 1 ex., 21. V. '72. 木上)

原の3種類に比べてPが少い。

4. ヒメセイルシハナカミキリ *Lemula refithorax* Pic

赤西 (11 exs., 10. V. '70.; 4 exs., 25. IV. '71.; 1 ex., 21. V. '72)

原 (1 ex., 2. V. '71). カエデ花上に多い。

5. キバネセイルシハナカミキリ *Lemula decipiens* Bates

赤西 (40 exs., 10. V. '70. カエデ花上; 1 ex., 31. V. '70. カマツカ

花上; 3 exs., 25. IV. '71). カエデ・カマツカ花上には多く見られる。

6. ヒナリハナカミキリ *Acmaeops minuta* (Gebler)

赤西 (4 exs., 25. IV. '71. 木上カマツカ・カエデ花上; 17 exs.,

1. V. '70.; 3 exs., 31. V. '70. カマツカ花上). 原 (1 ex., 2. V. '71)

7. =セヨコモノヒナトカミキリ *Pidonia simillima* Ohbayashi et Hayashi  
 音水 (1♂1♀, 8.VI.'69). 赤西 (1ex., 17.V.'71 カエテカ  
 9♂4♀, 28.V.'70 カマツカカエ上). 311。

8. セスジヒナトカミキリ *Pidonia amentata* (Bates)  
 音水 (4♂5♀, 8.VI.'69). 赤西 (2exs., 1.V.'70 カエテカ  
 38exs., 28.V.'70 カマツカカエ上).

9. ミワヒナトカミキリ *Pidonia miwai* (Matsushita)  
 音水 (5♂5♀, 8.VI.'69). 赤西 (1♀, 17.V.'71; 3♂2♀  
 21.V.'72; 2♂, 28.V.'70 カマツカカエ上).

10. (ヨフホシヒナトカミキリ) *Pidonia puziloi* (Solsky)  
 (フタオヒナトカミキリ)  
 音水 (9exs., 8.VI.'69). 赤西 (3exs., 25.VI.'71 ナカカキ  
 カエ上; 1ex., 17.V.'71 コマキ カエテ サシヨカカエ上 13♂11.)

11. ヤマヒナトカミキリ *Pidonia debilis* (Kraatz)  
 音水 (1ex., 18.V.'69; 1ex., 6.VII.'69). 赤西 (2ex.,  
 21.V.'72; 13exs., 31.V.'70 カマツカカエ上).

12. ヤマトヒナトカミキリ *Pidonia yamato* Hayashi et Mizuno  
 赤西 (1♂1♀, 28.V.'70 カマツカカエ上). 1971, 1972年  
 東京大学昆虫学研究所, 1971. 極東のヒナトカミキリ.

13. ナカカキヒナトカミキリ *Pidonia signifera* (Bates)  
 音水 (2♂, 8.VI.'69). 赤西 (1ex., 1.V.'71 カエテカ  
 20x20)

22 exs., 23.V.'71 カマツカ花上; 2 exs., 31.V.'70 カマツカ  
花上)。エヤハネの紋に変化あり。一見ニッポウヒキイ  
ト見間違ふ個体あり。カマツカ花上に多し。

✓ 14. キハリクヒキイナカミキリ *Pidonia discoidalis* (Pic)

音水 (1♀, 18.V.'69; 1♀, 24.VI.'69)。赤西 (1♀, 30.VI.'72  
3 exs., 21.V.'72; 1♂, 28.V.'70 カマツカ花上)。普通。

✓ 15. オスヒキイナカミキリ *Pidonia grallatrix* (Bates)

音水 (2♂, 18.V.'69; 1♂, 8.VI.'69)。赤西 (8 exs., 21.V.'72  
4 exs., 31.V.'70 カマツカ花上; 1 ex., 18.VII.'71 ノリウツキ  
花上)。カマツカ花上に多し。

Lepturini

16. ヤハネイナカミキリ *Anoplodera misella* (Fates)

音水 (7 exs., 6.VII.'69)。赤西 (1 ex., 25.VI.'72; 1 ex.,  
18.VII.'71)。原 (4 exs., 27.VI.'71)。多し。

17. ミヤマクヒキイナカミキリ *Anoplodera excavata* (Bates)

赤西 (1 ex., 28.V.'72; 2 exs., 18.VII.'71)。普通。

18. ミヤマウリイナカミキリ *Anoplodera azumensis* (Matsushita et  
Tamanuki)

赤西 (4 exs., 10.V.'70; 2 exs., 1.V.'71)。ヤマシ  
カエテ。ヒハカエテ等々得られぬが少し。

19. アカヒナカミキリ *Corymbia succedanea* (Lewis)

赤西 (2 exs., 30.VII.'72; 2 exs., 6.VIII.'72)。普通に見られず。

20. ツヤトシハナカミキリ *Marthaleptura scotodes* (Bates)

音水 (18. 8. ~~VI.~~ '69). 赤西 (3 exs., 28. V. '72 ; 1 ex.,  
11. VII. '71). 多くはな。

21. ヤマトキモノハナカミキリ *Judolia japonica* (Tamanuki)

赤西 (1 ♀, 2. VII. '72 ノリウツギ花上)。この採集例では、ウリの  
花は盛りを過ぎてより落下しやすい状態であった。稀。

22. マウカクハナカミキリ *Judolia cometes* Bates

赤西 (1 ex., 18. VII. '71 ノリウツギ花上)。少。

23. ヒゲジロハナカミキリ *Japanostrangalia dentatipennis* (Pic)

赤西 (2 exs., 18. VII. '71 ; 1 ex., 31. VII. '72 ノリウツギ花上)  
多くはな。

24. クロスジハナカミキリ *Eustrangalis distenoides* Bates

赤西 (1 ex., 10. V. '70 カエデ花上)。稀。

25. アオハハツハナカミキリ *Strangalomorpha tenuis* Solsky

音水 (1 ex., 8. VI. '69)。少。

26. =シツハナカミキリ *Parastrangalis nymphula* (Bates)

赤西 (2 exs., 21. V. '72 ; 1 ex., 30. VII. '72)。稀 (1 ex.,  
27. VI. '71)。少。

27. =ヨウホウハナカミキリ *Parastrangalis lesnei* (Pic)

赤西 (3 ♀, 9. VII. '72 ノリウツギ花上)。少。

28. タテジマハナカミキリ *Parastrangalis shikokensis* (Matsushita)

赤西 (1 ex., 25. VII. '72 ; 1 ex., 27. VII. '71 ; 1 ex., 2. VII. '72 ;  
1 ex., 18. VII. '71 ) (リウツキ花上)。 少い。

29. ヨツスジハナカミキリ *Leptura ochraceofasciata* (Motschulsky)

音水 (3 exs., 6. VII. '69) 。 赤西 (2 exs., 2. VII. '72 ; 4 exs.,  
18. VII. '71 ) (リウツキ花上)。 多し。

30. ノコハナカミキリ *Leptura aethiops* Foda

音水 (1 ex., 18. V. '69) 。 赤西 (1 ex., 28. V. '70 カマツカ花上  
1 ex., 31. V. '70 小うがらみ花上 ; 1 ex., 11. VII. '71) 。 普通に見えぬ。  
原 (1 ex., 27. VI. '71 ; 1 ex., 5. VII. '71) 。

31. ツマノハナカミキリ *Leptura arcuata* Panzer

赤西 (1 ex., 28. V. '70 ; 2 exs., 25. VI. '72 ; 1 ex., 31. VII.  
'72 ) (リウツキ花上)。 普通に見えぬ。

32. フタスジハナカミキリ *Nakanea vicaria* (Bates)

赤西 (5 exs., 18. VII. '71 ; 1 ex., 11. VII. '71 ; 2 exs.,  
30. VII. '72) 。 リウツキ花上で得られ、<sup>2</sup>多し。 少くは Ta...。

33. オオヨツスジハナカミキリ *Macroleptura regalis* (Bates)

赤西 (1♂1♀, 30. VII. '72 ; 1♀, 6. VIII. '72) 。 各はリウツキ  
花上に多く、<sup>2</sup>早稲刈り後持木上に見えぬ。

34. ミヤマホソハナカミキリ *Strangalia contracta* Bates

赤西 (3♀, 25.VI.'72 ; 1♀, 30.VI.'72)。各蜂の腹に本種にて  
多い。 原 (3ex., 27.VI.'71 ; 1ex., 15.VII.'71)。

35. ハコネホソハナカミキリ *Strangalia Hakonensis* Matsushita

赤西 (1♂, 1♀, VII.'71)。同時に20年集いたミヤマホソハナ18ex  
の中に本種が1頭だけ見出された。 少ない。

36. ホソハナカミキリ *Strangalia hosohana* Ohbayashi

赤西 (1ex., 28.V.'70)。 少ない。

III. カミキリ亜科 *Cerambycinae*

トゲトゲトゲカミキリ族 *Phoracanthini*

37. トゲトゲカミキリ *Allotraeus sphaerioninus* Bates

赤西 (9ex., 31.V.'70, 17カウミツヒ ; 1ex., 5.VII.'71  
1ex., 18.VII.'71)。 多く採れた。

ヒメカミキリ族 *Callidiopini*

38. ヨツボシカミキリ *Stenogrinum quadrinotatum* Bates

赤西 (1ex., 11.VII.'71)。 少ない。

39. アカイロカミキリ *Stenodryas clavigera* Bates

原 (1ex., 5.VII.'71 ヲツボシ)。 少ない。

アカイロカミキリ族 *Obrini*

40. シガオメカミキリ *Stenhomalus takaosanus* Ohbayashi

赤西 (1ex., 25.IV.'71 アカイロ ; 1ex., 1.V.'71 カズツヒ)



ヒゲナガゴバネカミキリ科 Molorchini

41. コボトジヒゲナガゴバネカミキリ Molorchus kobotokensis Ohbayash

赤西 (1♀, 1♂, '70 カエデ花上; 1♂1♀, 10♂, '70 カエデ花上;  
2♂2♀, 28♂, '70 カマツカ花上; 1♂1♀, 1♂, '71 カエデ花上;  
1♂, 17♂, '71 コマキ花上)。 1972年3月には1頭を採集出来  
た。 同月には別の個体の標本が採集された。

42. コジマヒゲナガゴバネカミキリ Molorchus kojimai (Matsushita)

赤西 (1♂1♀, 28♂, '70 カマツカ花上; 1♀, 1♂, '71 カエデ花上  
2♂1♀, 30♂, '72 カエデ花上; 1♂1♀, 21♂, '72 カマツカ花上)  
前種とほぼ同一 (1972年3月) にして、最もよく採集された。同月、  
当地には他に以外に他の標本が少い。

43. ナジヒゲナガゴバネカミキリ Molorchus gracilis Hayashi

赤西 (1♂, 1♂, '71 カエデ花上)。 得られた個体は一見して  
本種とよく似ていて、詳細には観察して kojimai に似ている  
ように思われる。しかし、触角の第3節と第4節の長さの比が  
本種とよく似ていて、 kojimai に似ていて、早稲は等  
長であるが、これは第4節が明らかに長い。 稀。

44. ウスグロヒゲナガゴバネカミキリ Molorchus fuscipennis Hayashi

赤西 (1♀, 1♂, '70 カエデ花上; 1♂, 10♂, '70 カエデ花上;  
1♂, 28♂, '70 カマツカ花上)。 本種も同様に別の個

数々の種が採られた。1971.2年度 芝に7種採集された。

ウスハカミキリ 科 Pyrestini

45. ウスハカミキリ *Pyrestes haematicus* Pascoe

音水 (17 exs., 20. VII. ~~70~~<sup>69</sup>)、リウツキ花上)。音水において

同時期に幼虫の月齢は6<sup>2</sup>、赤西においては得ていない。

ウリホシカミキリ 科 Compsocerini

46. ウリホシカミキリ *Rosalia Batesi* Harold

赤西 (4 exs., 18. VII. '71; 2 exs., 6. VIII. '72)。成虫は木上には

多い。原 (2 exs., 2 exs., 5. VII. '71; 2 exs., 11. VII. '71)

アオカミキリ 科 Callichromini

47. ミドリカミキリ *Leontium virde* Thomson

音水 (1 ex., 6. VII. '69)。赤西 (1 ex., 13. VI. '71; 1 ex., 18. VII. '71)

原 (1 ex., 27. VI. '71)。花上、成虫は木上には多い。

48. アヲアオカミキリ *Chloridolum thaliodes* Bates

赤西 (4 exs., 29. VII. '72; 2 exs., 6. VIII. '72)。本種は

木の葉の立木 (樹木の葉前を知らず) 及び成虫は木上には集

習性を持つ。この木で見つけられたのは、この科の幼虫の採集が

可能であり、上述の採集品は同一木上で得られたものである。

又、立木は垂直 (壁面) のものでなく、余りぬきにたてられ

たりに集まるように思われる。(樹木はサワラに似ている)。

スギカミキリ 族 Callidiini

49. ヒメスギカミキリ Palaeocallidium rufipenne (Motschulsky)

赤西 (161号, 2.V.'71) スギ木上; 4ex. 17.V.'71; 1ex. 23.V.'71)

50. シロオヒカミキリ Phymatodes albicinctus Bates

喜水 (1ex., 8.VI.'69). 赤西 (2ex., 28.V.'72 木上) 少い。

トウカミキリ 族 Clytini

51. <sup>=イシマ</sup> トウカミキリ Xylotrechus emaciatus Bates

赤西 (4ex., 2.VII.'72; 2ex., 16.VIII.'72). 伐跡の木上に普通に見られる。

52. ツマキトウカミキリ Xylotrechus clarinus Bates

喜水 (1ex., 24.VI.'69). 赤西 (1ex., 18.VI.'71). 前種よりかなり少い。

53. ウスヒトウカミキリ Xylotrechus cuneipennis (Kraatz)

赤西 (1ex., 25.VI.'72; 2ex., 6.VIII.'72). 伐跡の木上に普通。

54. シラケトウカミキリ Clytus melænus Bates

赤西 (1ex., 28.V.'72; 5ex., 2.VII.'72). 伐跡の木上に普通。

55. アキトウカミキリ *Clytus axuripilis* Bates

赤西 (2 exs., 24.V.'72 カマツカ花上; 1 ex., 28.V.'70

イワカウミ花上; 2 exs., 28.V.'72)。原 (1 ex., 2.V.

'71 カエデ花上)。多。

56. ヤマトニホトビトウカミキリ *Kazuoclytus lautoides* (Hayashi)

赤西 (1 ex., 30.IV.'72)。ニホトビトウカミキリのニホトビトウカミキリ

と。稀。

57. キスビトウカミキリ *Cyrtoclytus caproides* (Bates)

赤西 (1 ex., 27.VI.'71; 2 exs., 18.VII.'71)。普通。

原 (2 exs., 27.VI.'71)。

58. エダリトウカミキリ *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat)

清水 (1 ex., 8.VI.'69; 1 ex., 6.VII.'69)。赤西 (1 ex.,

13.VI.'71; 5 exs., 30.VII.'72)。原 (5 exs., 27.VI.'71

2 exs., 5.VII.'71)。極めて多。

59. フタホトビトウカミキリ *Chlorophorus muscosus* (Bates)

清水 (1 ex., 6.VII.'69)。赤西 (1 ex., 2.VII.'72; 5 exs.,

18.VII.'71) リウウギ花上)。多。

60. ホソトウカミキリ *Chlorophorus xeniscus* (Bates)

清水 (33 exs., 6.VII.'69) リウウギ花上)。赤西 (1 ex., 27.VI.

'71; 1 ex., 18.VII.'71)。清水での分布は、高土

2m位のうりの花に本種が多数発生していた。赤西で  
普通に見られた。

61. トウモロコシトウカミキリ *Demonax transilis* Pates

赤西 (1 ex., 1. V. '71 カエド花上; 14 exs., 28. V. '70 カマ  
ツカ花上; 1 ex., 13. VI. '71)。普通に見られた。

原 (3 exs., 2. V. '71 カエド花上; 2 exs., 29. VI. '71)。

62. キイロトウカミキリ *Grammographus notabilis* (Pascoe)

香取 (3 exs., 6. VII. '69)。赤西 (1 ex., 13. VI. '71;  
2 exs., 27. VI. '71)。原 (2 exs., 29. VI. '71; 2 exs.,  
5. VII. '71)。T=木上には極めて多い。

63. ヒメグサトウカミキリ *Chlorophorus diminutus* (Bates)

赤西 (17 exs.; 1. V. '70 カエド花上; 3 exs., 28. V. '70  
カマツカ花上)。原 (1 ex., 2. V. '71 カエド花上)。

カエド・カマツカ花上には極めて多い。

64. トウキヨウトウカミキリ *Chlorophorus yedoensis* (Kano)

赤西 (1 ex., 2. V. '71 カエド花上)。稀。

65. トカリバアカネトウカミキリ *Anaglyptus niponensis* Bates

赤西 (3 exs., 30. IV. '72 カエド花上; 1 ex., 31. V. '70  
イワガラミ花上; 1 ex., 28. V. '70 カマツカ花上)。

普通に見られた。

66. シムト'ウカミキリ *Paraclytus excultus* Bates

音水 (1 ex., 8. VII. '69). 赤西 (1 ex., 30. IV. '72 花上,  
2 exs., 17. V. '71 サンショウ花上; 1 ex., 31. V. '70 カマツカ  
花上). 普通に見られる。

バ = カミキリ 族 *Stenaspini*

67. バ = カミキリ *Purpuricenus temmincki* Guerin-Meneville

音水 (1 ex., 6. VII. '69). 原 (1 ex., 27. VI. '71)  
以外に少い。

68. ハリゴ'ロバ = カミキリ *Purpuricenus spectabilis* Motschulsky

赤西 (1 ex., 31. V. '70; 1 ex., 28. V. '72). 少い。

ホ'ウ'ウカミキリ 族 *Cleomenini*

69. ホ'ウ'ウカミキリ *Dere thoracica* White

赤西 (3 exs., 10. V. '70; 3 exs., 13. VI. '71). 原 (2 exs  
2. V. '71; 1 ex., 27. VI. '71). 少い。

70. タ'キ'グ'チ'モ'モ'ア'ト'ホ'リ'カミキリ *Cleomenes takiguchii* Ohbayashi

赤西 (3 exs., 18. VII. '71 リラツキ花上; 1 ex., 30. VII. '72  
リラツキ花上). 少い。

IV. フトカミキリ 亜科 *Lamiinae*

ゴ'マ'フ'カミキリ 族 *Mesosini*

71. ナ'ガ'ゴ'マ'フ'カミキリ *Mesosa longipennis* Bates

赤西 (2 exs., 9. VII. '72 ; 2 exs., 18. VII. '71). 枯木上にて  
普通に見えぬ。

72. タテスシゴマツカミキリ Mesosa senilis Bates

赤西 (1 ex., 5. VII. '71). 枯木上にて得られ、<sup>1</sup>幼虫は<sup>2</sup>幼虫より大。

73. カタシロコマツカミキリ Mesosa hirsuta Bates

赤西 (2 exs., 30. VII. '72). マカ 伐採木近くに飛来した。  
ニラホシサビカミキリ 類 Apomecynini

74. シタシロコマツカミキリ Asaperda agapanthina Bates

赤西 (1 ex., 28. V. '72). 同 (2 exs., 27. VI. '71).

75. キウスイマドマツカミキリ Asaperda rufipes Bates

赤西 (2 exs., 21. V. '72 ; 2 exs., 28. V. '72). 多。

サビカミキリ 類 Pteropliini

76. トカリシロオビサビカミキリ Pterolophia caudata (Bates)

赤西 (1 ex., 5. VII. '71 ; 1 ex., 18. VII. '71). 同 (1 ex.,  
5. VII. '71). 普通に見えぬ (枯木上)。

77. ヒメナカサビカミキリ Pterolophia leiopodina (Bates)

赤西 (1 ex., 28. V. '70 ; 16 17, 30. VII. '72). 伐採木上にて  
多。

78. エリサビカミキリ Pterolophia japonica Breunig

赤西 (1 ex., 25. VI. '72). 多。

79. アトジロサビカミキリ *Pterophia zonata* (Bates)

赤西 (1 ex., 30. VII. '72). 幼体数が多い。

80. アトモンサビカミキリ *Pterolophia riggida* (Bates)

香木 (1 ex., 8. VI. '69; 1 ex., 6. VII. '69). 赤西 (2 ex., 10. V. '70; 1 ex., 30. VII. '72). 原 (1 ex., 27. VI. '71).

幼体数にかなり多い。

81. ナカシロサビカミキリ *Pterolophia jugosa* (Bates)

赤西 (1 ex., 28. VI. '72). かなり多い。

82. シロサビカミキリ *Mesosella simiola* Bates

赤西 (1 ex., 21. V. '72; 2 ex., 9. VII. '72). 幼体数に非常に多い。

ヒゲナガカコフヤハスカミキリ 科 *Phrissomini*

83. ヒメコフヤハスカミキリ *Parechthistatus gibber* (Bates)

赤西 (2♂1♀, 21. VI. '72). 枯木上で得られた。

ヒゲナガカミキリ 科 *Agniini*

84. キナシカミキリ *Psacotha hilaris* (Pascoe)

赤西 (3 ex., 5. VII. '71; 1 ex., 30. VII. '72). 枯木上で得られた。

85. コマダウカミキリ *Anoplophora malasiaca* (Thomson)

原 (1 ex., 11. VII. '71). 少ない。



86. ヤハスカミキリ Uraecha bimaculata Thomson  
赤西 (1 ex., 5. VII. '71 ; 1 ex., 6. VIII. '72 枯木上)。多。

87. ヒメトカミキリ Monochamus subfasciatus Bates  
赤西 (2 exs., 28. V. '72 ; 1 ex., 30. VII. '72)。多。  
原 (1 ex., 27. VI. '71)。

88. ヒメトカミキリ Acalolepta fraudatorix (Bates)  
赤西 (1 ex., 6. VIII. '72)。多。

ヒメトカミキリ科 Ancyronotini  
89. ヒメトカミキリ Palimna liturata (Bates)  
赤西 (4 exs., 25. VI. '72)。普通に見られ (伐採木上)。

コブヒメトカミキリ科 Rhodopinini  
90. トイカミキリ Doiuis-divaricatus (Bates)  
音水 (1 ex., 18. V. '69)。赤西 (1 ex., 28. V. '72)。多。

91. ヒトオヒメアウゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus Bless  
赤西 (2 exs., 28. V. '72 ; 1 ex., 2. VIII. '72)。伐採木上。  
普通に見られ。

92. フタオビアウゲカミキリ Rhopaloscelis bifasciatus Kraatz  
赤西 (1 ex., 30. VII. '72)。細い枯木上で得た幼虫。

93. シロオビヒメカミキリ Sybrodiboma subfasciata (Bates)  
赤西 (1 ex., 25. VI. '72 ; 3 exs., 6. VIII. '72)。多。

ヤマナラシ) モモアトカミキリ 科 Acanthoderini

94. コイシモモアトカミキリ *Callapoecus guttatus* Bates

赤西 (1 ex., 6. VII. '72). 伐採木上で得られた幼虫。

95. トケムカミキリ *Eryssamena saperdina* Bates

赤西 (1 ex., 2. VII. '72; 3 ex., 30. VII. '72). 伐採木上に多い。

96. コマダウモモアトカミキリ *Leiopus stillatus* (Bates)

赤西 (1 ex., 25. VI. '72; 2 ex., 30. VII. '72). 伐採木上に多い。

97. カロアケシカミキリ *Exocentrus galloisi* Matsushita

赤西 (1 ex., 30. VII. '72). 細い枯枝上で得られた幼虫。

98. アトモマルケシカミキリ *Exocentrus lineatus* Bates

赤西 (18 1♀, 25. VI. '72; 1 ex., 30. VII. '72). 普通

99. キッコウモケシカミキリ *Exocentrus testudineus* Matsushita

赤西 (3 ex., 25. VI. '72). 細い枯枝上に多い。

100. シロオビコマアトカミキリ *Exocentrus guttulatus* Bates

赤西 (1 ex., 2. VII. '72; 1 ex., 30. VII. '72). 枯木上に普通。

トホシカミキリ 科 Saperdini

101. キクニカミキリ *Menesia sulphurata* (Gebler)

赤西 (4 ex., 2. V. '72; 4 ex., 25. VI. '72). 枯木上に

伐採木上に 普通。

102. ニセシロホシカミキリ *Pareutetrappa simulans* Bates

音水 (1819, 20.VII.'69). 少。

103. カスカキエンカミキリ *Paramenesia kasugensis* (Sek<sup>1</sup> et Kobayashi)

赤西 (1ex, 25.VI.'72). 佐野等ホエで得られた少。

104. ラミーカーミキリ *Paraglenea fortunei* Saunders

赤西 (1ex, 30.VII.'72; 1ex, 6.VIII.'72). 普通。

105. イニアオカミキリ *Eutetrappa chrysochloris* Bates

赤西 (1ex, 30.VII.'72; 1ex, 6.VIII.'72). 下草上

で見られた少。少。

106. ヤツメカミキリ *Eutetrappa ocelota* Bates

音水 (1ex, 24.VI.'69). 少。

107. シラホシカミキリ *Glenea relictata* Pascoe

音水 (1ex, 6.VII.'69). 赤西 (1ex, 25.VI.'72; 1ex, 6.VIII.'72). 普通に見られた。

108. ヘリウツリゴカミキリ *Nupserha marginella* (Bates)

音水 (1ex, 6.VII.'69). 赤西 (1ex, 25.VI.'72; 1ex, 18.VII.'71). 普通。

109. ホソ(キ)リゴカミキリ *Oberea inclusa* Pascoe subsp. *infranigrescens* Breuning

赤西 (1ex, 5.VII.'71).

110. ニセリゴカミキリ *Oberea mixta* Bates

赤西 (1ex, 5.VII.'71).

III. ヨツキナシカミキリ *Epigleæna comes* Bates

音水 (3 ex., 29. VI. '70). 赤西 (1 ex., 25. VI. '72).

(短報) 氷ノ山の甲虫数種について 辻 啓介

1. *Zeugophora annulata* Baly 7モンナガハムシ

2 exs. 6. V. 1972 K. Tsuji

扇ノ山, 氷ノ山から記録されたもの、珍しい種である。

2. *Lilioceris leuisci* Jacoby ヲビスナガハムシ

6 exs. 11. VI. 1972 K. T.

県下では扇ノ山, 氷ノ山, 音水に分布するの数は少ない。

3. *Cassida erudita* Baly シドリカメノコハムシ

1 ex. 16. VII. 1971 K. T. 兵庫県初記録

4. *Cassida vibex* Linné セスジカメノコハムシ

1 ex. 11. VI. 1972 K. T. 兵庫県初記録

4, 5 はアザミから採集した。

5. *Cassida rubiginosa* Müller アオカメノコハムシ

1 ex. 6. V. 1972 K. T.

4 exs. 10~12. VI. 1972 K. T.

6. *Cionus latefasciatus* Voss フロオビシロクマザウ

1 ex. 11. VI. 1972 K. T.

大田原にはいると四国に分布していることに気づくので本州初記録。