

兵庫県の異翅亜目 (4)

高橋 寿郎

Heteroptera-fauna of Hyogo Prefecture (4)

by Toshio Takahashi

Family Coreidae ヘリカメムシ科

1. *Molipteryx fuliginosa* Uhler オオヘリカメムシ

産地：洲本市先山〔1ex., 3.V.1973, 堀田, 1975〕,

神戸市六甲山〔1ex., 21.VIII.1958〕

山の街〔1ex., 17.V.1953, 1ex., 1.V.1958〕

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

豊岡市福田〔7.VI.1973, 高橋, 1975〕

城崎郡三川山〔5.V.1973, 高橋, 1975〕

多可郡三谷〔3exs., 13.VI.1975, 2exs., 13.X.1975〕

鳥羽〔2exs., 1.V.1975〕

宍粟郡音水〔1ex., 10.V.1970, 1ex., 31.V.1970, 1ex., 13.V.1973〕

養父郡氷ノ山〔1ex., 27.VI.1956〕〔21.V.1973, 高橋, 1975〕

美方郡扇ノ山〔黒田, 1964〕

大形種であり個体数は必ずしも多くはないけれども県下に広く分布していると思われる。

2. *Homoeocerus unipunctatus* Thunberg ホシハラビロヘリカメムシ

本種は県下に広く分布する種である。したがって産地の記録は省略する。

3. *Homoeocerus dilatatus* Horuath ハラビロヘリカメムシ

本種は前種に比して個体数は少いがやはり県下には広く分布している。産地の記録は省略した。

4. *Anacanthocoris concoloratus* Uhler アズキヘリカメムシ

産地：氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

5. *Anacanthocoris striicornis* Scott オオクモヘリカメムシ

産地：神戸市鳥原〔1ex., 30.X.1971〕

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

豊岡市神武山〔12.X.1973, 高橋, 1975〕

養父郡氷ノ山 (1 ex., 27.VI.1956, 1 ex., 15.X.1973, K.Tsuji leg)

6. *Hygia opaca* Uhler ツマキヘリカメムシ

本種も県下にはやゝ普通に産する種であり一々産出記録は省略したいが一応産地名だけ記しておく。戸屋市, 神戸市一山の街, 谷上, 蓬山峡, 白川, 太山寺, 明石市明石公園, 氷上郡, 飾磨郡雪彦山, 多可郡三谷, 相生市三瀬山, 宍粟郡音水, 坂ノ谷。

7. *Colpura lativentris* Motschulsky オオツマキヘリカメムシ

前種によく似ている。前種程多くないようであるが広く分布していると考えられる。本種も産地のみ記録しておく。西宮市岡田山, 神戸市布引, 鳥原, 三原郡諭鶴羽山, 相生市三瀬山, 多可郡鳥羽, 宍粟郡音水, 養父郡氷ノ山。

8. *Acanthocoris sordidus* Thunberg ホホズキカメムシ

産地: 神戸市鳥原 (2 exs., 23.K.1973, 1 ex., 7.V.1974)

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕,

豊岡市倉見〔24.VI.1973, 高橋, 1975〕

赤穂市天和 (1 ex., 25.K.1974)

県下に広く分布していると思うが産地は余り知られていない。

9. *Plinactus bicoloripes* Scott キバラヘリカメムシ

産地: 西宮市岡田山〔女学院, 1974〕

神戸市 (1 ex., 5.V.1968, 1 ex., 28.V.1972, 1 ex., 21.III.1974,

1 ex., 3.VIII.1974, 5 exs., 10.VIII.1974, 3 exs., 1.VIII.1974)

美方郡湯村 (1 ex., 27.VI.1952),

扇ノ山〔10.VI.1973, 高橋, 1975〕

県下の産出状況は余り知られていないが鳥原には極めて多く産する、よって分布は広い種だろうと考へている。

10. *Cletus pungnator* (Fabricius) ヒメハリカメムシ

本種も県下に広くいるように思われるが産地の記録がほとんどない。

産地: 津名郡北淡町江崎 3 exs.,

洲本市生石 2 exs.,〔7~10.X.1973, 川沢, 1974〕

相生市三瀬山 (1 ex., 6.V.1973)

11. *Cletus rusticus* Stål ハリカメムシ

産地: 三原郡諭鶴羽山〔1 ex., VIII.1973, 友園, 1974〕

西宮市岡田山〔女学院，1974〕
 神戸市六甲山（1ex., 15.VI.1956）
 明石市明石公園（1ex., 29.VI.1975）
 豊岡市上佐野〔26.V.1973, 高橋，1975〕
 多可郡笠形山（1ex., 12.VI.1975）
 白山（1ex., 3.V.1973）
 宍粟郡音水（1ex., 10.VIII.1975）

12. *Cletus bipunctatus* Herrich-Schaffer コブハリカメムシ
 産地：城崎郡城崎〔30.VIII.1975, 高橋，1975〕

13. *Cletus trigonus* Thunberg ホソハリカメムシ
 産地：三原郡福良〔2exs., X.1972, 友国，1973〕

津名郡五色町都志，5exs.,	北淡町室津，1ex.,
江崎，3exs.,	淡路町田之代，6exs.,
東浦町浦，2exs.,	野田，14exs.,
津名町佐野，7exs.,	洲本市天川，1ex.,
生石，8exs.,	三原郡南淡町黒岩，18exs.,
新川，16exs., [7~10.X.1973, 川沢，1974]	

西宮市岡田山〔女学院，1974〕
 神戸市布引（1ex., 17.V.1959）
 鳥原（1ex., 4.VI.1971, 2exs., 20.VI.1971, 1ex., 2.VI.1972）
 蓬山峽（1ex., 13.V.1962）
 須磨鉢伏山（1ex., 9.VIII.1975）
 氷上郡〔山本，1954，1958〕
 豊岡市倉見〔24.VIII.1973, 高橋，1975〕
 日高町江原〔18.VIII.1973, 高橋，1975〕
 加西市畑（1ex., 27.VI.1974）
 相生市三瀬山（1ex., 12.V.1974）
 宍粟郡音水（1ex., 3.V.1973）

14. *Coriomeris scabricornis* Panzer ヒメハリカメムシ
 産地：神戸市鳥原（1ex., 6.X.1964）

加古川市大久保 (1 ex., 13 . K , 1964)

海岸地帯に多くいる種とのことで調査が不充分の種である。

15. *Paraplesius unicolor* Scott ヒメクモヘリカメムシ

産地：氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

加西市畑 (1 ex., 29 . V . 1974)

美方郡扇ノ山〔黒田, 1964〕

個体数はそう多くないように思われるが調査不充分である。

16. *Leptocorixa corbetti* China クモヘリカメムシ

産地：津名郡東浦町野田, 8 exs.,

津名町佐野 2 exs.,

洲本市生石, 38 exs.,

三原郡南淡町黒岩, 4 exs.,

新川, 14 exs.,〔7~10 . x . 1973 . 川沢, 1974〕

神戸市烏原 (1 ex., 28 . V . 1967)

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

城崎郡城崎町今津, 23 . VIII . 1973

豊岡市妙楽寺, 7 . K . 1973〔高橋, 1975〕

加西市畑 (1 ex., 29 . V . 1974)

養父郡氷の山 (1 ex., 15 . K . 1973, K. Tsuji log.)

17. *Riptortus clavatus* Thunberg ホソヘリカメムシ

産地：洲本市安平町, 1 ex., 16 . VIII . 1947

先山, 1 ex., 23 . VII . 1951〔堀田, 1975〕

西宮市岡田山〔前多他, 1974〕

三原郡三熊山〔1 ex., XI . 1972, 友国, 1973〕

神戸市六甲山 (1 ex., 20 . VIII . 1961)

保久良山 (1 ex., 1 . V . 1955)

烏原 (1 ex., 16 . VII . 1967, 2 exs., 5 . V . 1968, 1 ex., 4 . VIII . 1968,

1 ex., 8 . K . 1968, 2 exs., 24 . V . 1970)

丹生山 (1 ex., 18 . V . 1959)

谷上 (1 ex., 29 . IV . 1958)

太山寺 (1 ex., 29 . IV . 1973)

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

豊岡市倉見, 24.VI.1973,

妙楽寺, 5.X.1973

神武山, 12.X.1973〔高橋, 1975〕

宍粟郡音水 (2 exs., 30.VI.1972)

18. *Rhopalus (Aeschynoteles) maculatus* Faieber アカヒメヘリカメムシ

産地: 西宮市岡田山〔女学院, 1974〕

神戸市藍那 (2 exs., 9.V.1968)

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

多可郡三谷 (1 ex., 13.VI.1975)

養父郡水ノ山 (1 ex., 15.X.1973, K.Tsuji log)

19. *Stictopleurus crassicornis* Linne ブチヒゲヘリカメムシ

産地: 三原郡先山〔1 ex., X.1972, 友國, 1973〕

三原郡西淡町丸山, 2 exs.,

津名郡五色町都志, 4 exs.,

北淡町江崎, 3 exs.,

淡路町田之代, 12 exs.,

東浦町浦, 2 exs., [7~10.X.1973, 川沢, 1974]

神戸市六甲山 (1 ex., 21.V.1958)

藍那 (1 ex., 6.V.1965)

烏原 (2 exs., 27.V.1971, 3 exs., 13.V.1971, 1 ex., 3.V.1972,
1 ex., 4.V.1972)

帝釈山 (1 ex., 30.V.1973)

氷上郡〔山本, 1954, 1958〕

加西市畑 (1 ex., 13.VI.1974)

多可郡三谷 (2 exs., 8.V.1975)

鳥羽 (1 ex., 29.V.1972)

相生市三瀬山 (1 ex., 20.V.1973, 1 ex., 6.VI.1973,

1 ex., 3.V.1974, 3 exs., 1.V.1974)

宍粟郡音水 (1 ex., 30.V.1970, 1 ex., 25.V.1972,

6 exs., 16.VI.1972, 2 exs., 13.V.1973,

1 ex., 15.VI.1973)

20. *Liorhyssus hyalinus* Fabricius スカシヒメヘリカメムシ

産地：津名郡淡路町田之代〔1 ex., X. 1973, 川沢, 1974〕

多可郡鳥羽〔1 ex., 6. X. 1975〕

宍粟郡音水〔1 ex., 23. V. 1972〕

Family Berytidae イトカメムシ科

1. *Yemma exilis* Horuath イトカメムシ

産地：三原郡先山, 1 ex., X. 1972 三熊山, 1 ex., X. 1972

福良, 2 exs., X. 1972〔友園, 1973〕

兵庫県産異翅亜目に関する文献追加

1974, 石原 保(代表)：本四架橋ルート of 島々の昆虫相

本州四国連絡架橋に伴う周辺地域の自然環境保全のための調査報告書

(その2), 学術調査編(動物部門), pp. 79-80

同一表題の前報文(1973)以後、同じメンバーで昭和47, 48年度にかけて数回にわたり調査を実施された結果をこゝに第2報として発表された。異翅亜目については前報文と同じ宮武睦夫・友園雅章両氏の調査による。中に兵庫県下初めての記録であるスナコバネナガカメムシがふくまれている。

1975, 奥谷 禎一：北摂に産する珍しい昆虫

兵庫県の自然, V(2): 41-42

1975, 小林 桂助：モズのはやにえに見られるこん虫類について

けんせい, 28: 7-18

1975, 高橋 匡：豊岡高等学校昆虫標本目録(第3報)

兵庫県立豊岡高等学校生物教室, 1975・12., pp. 1-24

(ref. p. 2-3)

県北部産異翅亜目19種の記録がある。エゾツノカメムシ, コブハリカメムシは共に兵庫県から初めての記録である。

尚直接兵庫県産の異翅亜目に関する文献ではないが川沢哲夫・川村満両氏著、"原色凶蟲・カメ

ムシ百種 (全国農村教育協会, 1975) が出版されている。美しいカラー写真が232点もあり他に図版53点でカメムシ防除を目的にまとめられたものであるが私達カメムシの好きな者には大変楽しい図鑑であるので紹介しておく。

(14-XII-1975)

コヒゲシマビロウドコガネ大屋町田淵山に産す

(兵庫県産甲虫相資料, 54)

高橋 寿郎

昭和50年度の兵庫昆虫同好会談話会の席上(11月23日)遊磨正秀氏が同年8月5日大屋町田淵山での夜間採集で得られた甲虫類を持参され拝見することが出来、その中にコヒゲシマビロウドコガネが2匹入っていた。本種は兵庫県下からは初めての記録種なので遊磨氏のお許しを得て此処に発表させて頂く。

Gastroserica brevicornis (Lewis) コヒゲシマビロウドコガネ

養父郡大屋町田淵山, 2♀♀, 5・Ⅷ. 1975 遊磨正秀 採集

ご承知のごとく日本産*Gastroserica*属は2種を産し、他の1種は*G. hignonis* (Lewis)、ヒゴシマビロウドコガネで九州にのみ産する。

本種の分布は本州, 四国, 九州となっているが必ずしもその産出状況が広く知られていない。LewisによりNihho (日光) 及びShinkano (岐阜県の新加納) 産の標本により1895年記載された種である。

近畿地方では三重県, 奈良県下からのみ記録されており(平倉演習林, 八幡村, 吉野郡下, 春日山, 護摩壇山, 大台ヶ原等)、兵庫県からは始めてであるばかりでなく西万中国地方からの産が全く記録されていない。四国では面河溪, 剣岳, 高知等、九州では彦山が知られている。三重県の平倉演習林では電燈に飛来することがだいぶ前から知られており筆者の手許にも大倉正文氏採集の同地産1♂, 1♀(16-Ⅷ-1955)を同氏の御好意で保管している。一般にその生態がよくわかっていないから採集されることも少く記録も余り無いのかも知れない。とにかくこの種が兵庫県下に分布していることがわかって大変うれしいことである。

(25-XII-1975)