

町木見 (1 ex., 20-VII-1980), 逢山峡 (1 ex., 7-VII-1987), 伊川谷 (1 ex., 6-VII-1988), 石井ダム (1 ex., 18-X-1991). 氷上郡神楽村 (青垣町) [山本, 1953]. 飾磨郡夢前町雪彦山 (2 exs., 14-VII-1957). 揖保郡新宮町福原 (1 ex., 7-VII-1992 etc.). 粟栗郡波賀町音水 (7 exs., 13-VII-1958 etc.), 波賀町坂ノ谷 (4 exs., 9-VI-1973). 出石郡但東町平田 [高橋, 1965]. 城崎郡日高町三川山 [上田, 1996]. 養父郡関宮町氷ノ山 (11 exs., 27-VII-1956 etc.) [木元, 1964; 上田, 1996]. 美方郡浜坂町味原, 宇都野神社, 観音山 [磯野, 1985], 温泉町扇ノ山 [高橋, 1975].

Genus *Crioceris* Muller, 1764

アスパラガスハムシ属

この属のハムシは日本に2種産し, 兵庫県下からも2種が知られている.

32. *Crioceris orientalis* Jacoby, 1885

カタボシクビナガハムシ

体背面は一般に赤褐色, 上翅の黒紋は変異が多い. 食草はクサスギカズラが知られている. 兵庫県下では宝塚市内での記録があるのみで, 調査が不十分ようである.

産地: 宝塚市宝梅川一丁目 [小田中, 1994].

33. *Crioceris quatuordecimpunctatata* (Scopoli, 1763)

ジュウシホシクビナガハムシ

アスパラガスの害虫として知られている. 県下でもアスパラガスを栽培している地には産すると考えられるが, 記録は少ない (産地では多数の個体が得られているようである). この種も県下の分布を再調査する必要がある.

産地: 城崎郡竹野町和田 [本庄, 1990]. 美方郡浜坂町城山 [磯野, 1985].

参考文献は, 今後の報告におけるものと重複しているものが非常に多いので, 最後に一括して掲載する予定である.

マルエンマコガネを高砂市で採集

岩見 裕介

ぼくは, 1994年10月23日, 高砂市でマルエンマコガネ *Onthophagus viduus* を採集しました. マルエンマコガネは, あまり多い虫ではないと聞いたので, 報告します.

1 ♀, 兵庫県高砂市北浜町北脇, 岩見裕介採集・谷角素彦保管

小学校の帰り, アスファルトの道路のすみで見つけました. 最初, 動かなかったので死んでいるかと思いましたが, 触てみると動き出しました. この虫を採った場所の近くにフンは見当らず, 少しはなれたところに犬のフンがありました. 当日は, 小雨が降っていました.

この虫は, 自宅のまわりの猫のフンでも見られます.

クロコノマチョウを高砂市で採集

岩見 裕介

ぼくは, 1996年4月24日, 高砂市でクロコノマチョウ *Melanitis phedima* を採集したので, 報告します.

1 ♀, 兵庫県高砂市北浜町北脇, 1996-IV-24, 岩見裕介採集

小学校に行こうとしていた午前7時40分ごろ, 人家の近くにある田んぼの枯れた稲にとまっているところを見つけ, 手でつまんで採集しました.

採集したチョウを図鑑で調べたら, クロコノマチョウの秋型の♀とされているものに似ていました.

参考文献

川副昭人・若林守男 (1976) 原色日本蝶類図鑑, 保育社, 大阪.