

産地、洲本市先山[久松, 1974]、川辺郡猪名川町民田[仲田, 1978]、川西市笠部、畦野、横地[仲田, 1978, 1982]、伊丹市[河上, 1984]、宝塚市大峰山、亮布が丘[伊藤, 1992]、西宮市角石町[芦田, 1983]、神戸市六甲山[矢野, 竹中, 1938]、鳥原(1ex., 24. VI. 1982)、藍那(1ex., 19. VI. 1978, etc.)、氷上郡柏原[山本, 1958]、養父郡氷の山[辻, 1970, 高橋, 1982]、八鹿町岩崎[佐藤, 1997]、美方郡扇の山[辻, 1963, 1970, 辻・岸田, 1982, 高橋, 1982]。

(兵庫県甲虫相資料・345)

(TAKAHASHI TOSHIO 神戸市兵庫区氷室町1-44)

拙著“日本に産するコガネムシ類の分類目録”に追加すべき日本産のコガネムシ

高橋 寿郎

最近、三宅義一氏から多数のコガネムシに関する文献別冊の御恵送に預かった。その中で拙著“日本に産するコガネムシ類の分類目録”(きべりはむしVol. 25, No. 3, 特別号, 1997)に追加すべき日本産コガネムシが次のとくあったので、此處に報告しておく。

貴重な論文別冊を御恵与下さった三宅義一氏に厚くお礼申しあげる。

Trox uenoii matsumurai Y. MIYAKE et YAMAYA, 1995
オキナワコブシコガネ

Bull. Nagaoka Mun. Sci. Museum, (30):31-32,
Figs. 1&7, 1995.
Holotype: ♂, Kunigami Son, Kunigami-Gun,
Okinawa Is., Ryukyu 21. V. 1994. M. MATSUMURA
leg.

paratypes: 1♂, Ie Rindo, Kumigami Son, Okinawa Is., 3. VII. 1993, M. Kubota leg., 3♂♂, 1♀,
same data as the holotype.

Maladera imasakai Y. MIYAKE et YAMAYA, 1995

ヤンバルビロウドコガネ

Bull. Nagaoka Mun. Sci. Museum (30):34-35,
Figs. 3&10, 1995.

Holotype: 1♂, Ie Rindo, Kunigami, Northern
part of Okinawa Is., 25. VII. 1993, M. Kubota
leg.

paratypes: 9♂♂, 4♀♀, Terukubidake, Okinawa I
s., 19. VII. 1976: 1♂, 20. VII. 1976, Y. Kusu: leg
(in coll. Kusu).

(TAKAHASHI TOSHIO 神戸市兵庫区氷室町1-44)

上郡町でオオセンチコガネを採集

高島 昭

赤穂郡上郡町でオオセンチコガネが、本会会員の蛭田永規氏により採集されているので報告しておく。

上郡町上郡 21. IV. 1998 1♂ 蛭田永規採集

本種は、高橋(1996)によると兵庫県下各地に分布し、西播地方では相生市三瀬山でも採集されているという。今回の記録は上郡町の中心地付近での記録であり、周辺の既知産地は前述の三瀬山である。採集した個体は、県上郡総合庁舎北側の県道上を歩行中であったといい、おそらく前夜、灯火に飛来したものであろうと推測されるが、三瀬山とはかなりの距離(直線距離で約 9 km)があり、近隣の山を含め当地域では広く分布していると考えられる。今後も注意して観察したい。なお、採集データと個体を提供いただいた蛭田氏には御礼申し上げる。

<参考文献>

高橋寿郎(1996) オオセンチコガネとセンチコガ
ネ きべりはむし24(1):7-13.

(TAKASHIMA AKIRA 姫路市書写2542-2)