

のヤナギは折れ易いが挿し木も簡単であると教えてもらった)。2週間ほどで新しい芽が出てきて利用できるようになった。しかし自然状態では(観察を続けたのだが)卵も幼虫も発見することが出来なかった。枝が折れ易く、脚立を使って捜してみたのだが、6mを越す木もあり、卵を得てからは諦めてしまった。

★ 第二化の産卵でネット上に産んだ卵5個と竹の上に産んだ卵2個の合計7卵からは5匹の幼虫を得ることが出来た。自然状態の卵も2個得ていたのだが1匹袋をかけたまま台風で飛ばされてしまった。結局6匹の幼虫を飼育し始めた。半分の3匹は自然状態で飼育しようとして池のヤナギで袋がけにしていたのだが、台風のためか、子供のいたずらのためか、袋はずれていて駄目になってしまった。

(たにがわ だいかい)

ウスイロコノマチヨウ飛び来る 谷川大海²

9/1に「沼の林床」で♀一頭(♂は目撃のみ)、9/2に「林の林床」で♂一頭、それぞれを共に早朝まだ露の残る林縁で採集した(どちらも夏型)。9/3に「沼の林床」で再び♂を目撃する(9/1に見たのと同じかどうかは分からず)。これらの林床はクロコノマチヨウの飼育で観察を続けていたので、これらは他から飛来したものと思われる。この後も観察を続けていたが、9/19になって「林の林床」の林縁で、午後1時頃、♂一頭を採集した。この♂が9/3に再度目撃したものかどうかは分からないが、新鮮な個体でないし、「林の林床」は「沼の林床」の北約500mにあることを考えると、同じ♂が飛んで来た可能性はある。なお9/1に採集した♀から卵を得ている。結果を次号で報告できればと思っている。

(たにがわ だいかい)

淡路島未記録の蜂類 大草伸治³

筆者はここ数年淡路島で昆虫を採集してきました。今回は蜂類の中でいくつかの島内未記録と思われる種をここに報告します。なお標本は自然環境研究所(NSI)⁴⁾に保管しています。

Diprionidae マツハバチ科

ネズハバチ *Monoctenus nipponicus* TAKEUCHI

津名郡東浦町白山	3♂	1991. 4. 20/ 3♂	1992. 4. 18
津名郡北淡町舟木	2♂	1992. 4. 23	

3: 〒494 愛知県尾西市明地字丸川 41-10

4) 兵庫県津名郡津名町人町畑 235