

# 氷の山周辺のカミキリむし分布調査

黒田 収

兵庫県産カミキリむしの分布調査は、先輩諸氏により早くから究明され、他府県に先がけて、カミキリむしリストが出来上っていた。

筆者は今回、氷の山周辺の地域(特に氷の山坂の谷、横行溪谷及三室山の音水溪谷、赤西溪谷、等)を中心に調査した。同地域の調査報告は数々有り、1972年6月に岡山県の黒田祐一氏が精査され、記録報告等もまとめられている。1980年には、高橋匡氏が、但馬地方昆虫目録第3報で、氷の山以北をまとめられ発表されている。この様に同地域は調査発表が活発に行なわれているが、追加種もかなり有り、もう1度、筆者なりにまとめてみる事にした。

なに分、資料不足、研究不足で、見落としている資料も多々あろうかと思われまますので、御気付きの点、筆者まで、御連絡下さいませ様宜しく御願致します。

下記リストは、筆者採集記録を中心に、採集地、年月日を記し、不足分は過去記録されている文献、記録報告等より抜すいし、採集地、年月日、採集者を掲げた。文献より記した採集データは、同地域の記録であって、かならずしも、兵庫県下の初記録ばかりでない事をおことわりしておく。

終りに、採集に同行願った、姫昆グループの方々、特に相坂、花岡、吉田の諸氏、記録その他いろいろと御教示願った、小倉滋氏、高橋久夫氏、三木進氏に、厚く御礼申し上げます。

## I ノコギリカミキリ亜科 Prioninae

### ①ウスバカミキリ *Megopsis sinica* WHITE

同地域に広く分布するが、個体数は少ない。引原ダムの灯火によく飛来する。

赤西谷(1ex, 1978-Ⅷ-7)

引原ダム(2exs, 1982-Ⅷ-8)

### ②ノコギリカミキリ

*Prionus insularis* MOTSCHULSKY

普通種で夜間灯火に飛来する。

引原ダム、音水谷、横行谷で見られる。

### ③ニセノコギリカミキリ *P. sejunctus* HAYASHI

ノコギリカミキリと非常によく似ていて出現期がやや遅い。

音水谷(1ex, 1981-Ⅸ-6)

### ④コバネカミキリ *Psephactus remiger* HAROLD

各谷に広く分布しているが、個体数は少ない。

横行谷(1ex, 1980-Ⅶ-27)

赤西谷(1ex, 1980-Ⅷ-24)

## II クロカミキリ亜科 Spondylinae

### ⑤クロカミキリ

*Spondylis buprestoides* (LINNAEUS)

広く分布する。

引原ダム(3exs, 1982-Ⅷ-8)

音水谷(2exs, 1981-Ⅶ-11)

## III ヒラタカミキリ亜科 Aseminae

### ⑥ツシマムナクボカミキリ

*Cephalallus unicolor* (GAHAN)

当地域では少ない。

引原ダム(1ex, 1982-Ⅷ-8)

### ⑦サビカミキリ

*Arhopalus rusticus* (LINNAEUS)

引原ダム(1981-Ⅶ-10 相坂)

### ⑧オオクロカミキリ

*Megasemum quadricostulatum* KRAATZ

赤西谷、音水谷で採集されている。(1ex, 1973-Ⅶ-27 遊磨)

## IV ホソカミキリ亜科 Disteniinae

### ⑨ホソカミキリ *Distenia gracilis* (BLESSIG)

普通種で各谷に7月~9月末まで見られる。

赤西谷(1ex, 1979-Ⅶ-3)

音水谷(1ex, 1981-Ⅸ-13)

引原ダム(1ex, 1982-Ⅷ-8)

## V ハナカミキリ亜科 Lepturinae

### ⑩テツイロハナカミキリ

*Encyclops olivacea* BATES

当地域では、氷の山で見られ花上に群らがる。

坂の谷(6exs, 1982-V-23)

### ⑪ヒラヤマコブハナカミキリ

*Encyclops bicolor* (OHBAYASHI)

非常に少ない種である。最近、赤西谷のカエデ花上より採集されたらしい。

氷の山(1ex, 1972-Ⅶ-10 畑中)

### ⑫フタコブルリハナカミキリ

*Stenocorus caeruleipennis* BATES

- 広く分布するが個体数は少ない。  
赤西谷(1ex, 1980-V-17, 小倉・1ex, 1982-IV-6, 相坂)  
氷の山(1ex, 1971-VII-17, 辻)
- ⑬モモグロハナカミキリ *Toxotinus minutus reini* (HEYDEN)  
各谷で採集されるも少ない。  
赤西谷(1ex, 1981-IV-23)
- ⑭フタスジカタビロハナカミキリ  
*Evodinus bifasciatus japonicus* MATSUSHITA  
非常に少ない。音水谷(1ex, 1979-V-5, 山下)  
採集を大平氏が報告されている。赤西谷では三木市の小倉氏が1982年5月に採集されている。又扇ノ山で内藤氏により1980年5月11日に採集されているので、中国山地に点々と少数発生していると思われる。
- ⑮カラカネハナカミキリ *Gaurodes doris* BATES  
当地ではいずれの谷でも5月~7月に多産している。
- ⑯アカイロニセハムシハナカミキリ *Lemula nishimurai* SEKI  
下記3種共、同環境に見られるが最も個体数が少ない。  
赤西谷(8exs, 1981-V-10)  
横行谷(6exs, 1980-V-4)
- ⑰キバネニセハムシハナカミキリ *L. decipiens* BATES  
いずれの谷でも、春先多数見られる。  
赤西谷(20exs, 1981-V-10)  
横行谷(36exs, 1980-V-4)
- ⑱ピクニセハムシハナカミキリ *L. rufithorax* Pic  
春先、花上に多数見られる。  
赤西谷(14exs, 1981-V-10)  
横行谷(11exs, 1980-V-4)
- ⑲ヒナルリハナカミキリ *Acmaeops minuta* (GEBLER)  
普通種でいずれの谷でも多数発生する。
- ⑳シコクヒメコブハナカミキリ *Pseudosieversia shikokensis* HAYASHI  
非常に稀れで赤西谷でカツラの生木上に飛来したのを偶然採集した。  
赤西谷(1ex, 1980-IV-15)
- ㉑ニセヨコモンヒメハナカミキリ  
*Pidonia simillima* OHBAYASHI et HAYASHI  
いずれの谷でも発生するが、多くはない様子。  
赤西谷(1ex, 1981-VI-14)
- ㉒セスジヒメハナカミキリ *P. amentata* (BATES)  
ヒメハナカミキリ中で最も早くから発生し、個体数も多い。  
赤西谷(25exs, 1981-V-7)  
横行谷(11exs, 1980-V-30)
- ㉓ミワヒメハナカミキリ *P. miwai* (MATSUSHITA)  
5~6月、各谷で発生する。  
赤西谷(4 exs, 1982-VI-6)  
横行谷(12exs, 1980-VI-1)
- ㉔トサヒメハナカミキリ *P. approximata* KUBOKI  
前種同様5~6月、発生するがあまり多くない。  
赤西谷(1ex, 1980-V-18)  
横行谷(2exs, 1980-VI-1)
- ㉕チュウジョウヒメハナカミキリ  
*P. chujoi* OHBAYASHI et HAYASHI  
坂の谷(1ex, 1971-VI-20 黒田祐一)
- ㉖フタオビチビハナカミキリ *P. puziloi* (SOLSKY)  
各谷で採集されている。赤西谷に多く見られ、1度に多数採集される事が有る。  
赤西谷(12exs, 1979-V-13)  
横行谷(6 exs, 1980-VI-1)
- ㉗チャイロヒメハナカミキリ *P. debilis* (KRAATZ)  
5~6月各谷に広く分布している。  
赤西谷(8exs, 1981-VI-14・6exs, 1982-VI-6)  
横行谷(2exs, 1981-VI-7)
- ㉘ヤマトヒメハナカミキリ  
*P. yamato* HAYASHI et MIZUNO  
少ない。筆者も未採集である。  
三室山(2exs, 1970-V-28 畑中)の報告がある。
- ㉙ヘリモンヒメハナカミキリ  
*P. matsushitai* OHBAYASHI  
各谷に広く分布するが氷の山周辺に特に多い。  
赤西谷(2 exs, 1982-V-9)  
横行谷(14exs, 1981-V-30)
- ㉚ナガバヒメハナカミキリ *P. signifera* BATES  
5~6月各谷に広く分布し、個体数も多い。  
赤西谷(4 exs, 1981-VI-8)  
横行谷(8 exs, 1981-V-30)  
坂の谷(2 exs, 1982-V-23)
- ㉛ヒメハナカミキリ *P. mutata* (BATES)  
坂の谷で5月中旬より6月中旬の短い間に見られる。  
坂の谷(7 exs, 1982-V-23)
- ㉜カクムネヒメハナカミキリ *P. maculithorax* PIC  
少ない。

- 坂の谷(1 ex, 1971-VI-27 黒田祐一)の報告が有る。
- ③③キベリクロヒメハナカミキリ *P. discoidalis* Pic  
分布は広いが個体数は多くない。赤西谷に多い。  
赤西谷(2 exs, 1981-V-7・2 exs, 1981-V14)  
坂の谷(2 exs, 1981-VII-26)
- ③④オオヒメハナカミキリ *P. grallatrix* (BATES)  
5~7月に発生し、各谷で普通に採集される。  
赤西谷(6 exs, 1981-VI-14・3 exs, 1982-VI-6)
- ③⑤チビハナカミキリ  
*Grammoptera chalybeela* BATES  
坂の谷で花上よりヒメハナカミキリ類と共に採集される。  
坂の谷(2 exs, 1982-V-23)
- ③⑥ヘリウスハナカミキリ  
*Pyrrhona laeticolor* BATES  
氷の山で採集されているが少ない。  
氷の山(1 ex, 1972-VI-10 畑中)  
〃 (1 ex, 1972-VI-11 辻)
- ③⑦ヤマトキモンハナカミキリ  
*Judolia japonica* (TAMANUKI)  
この種も少ないと思われる。  
三室山(1 ex, 1972-VII-2 畑中)  
氷の山(1 ex, 1973-VII-8 中川)  
赤西谷(1 ex, 1980-V-27 小倉)の各報告がある。
- ③⑧マルガタハナカミキリ *J. cometes* (BATES)  
普通種で7~8月花上に群がる。  
赤西谷(1 ex, 1981-VII-27)  
横行谷(1 ex, 1980-VII-27)  
戸倉峠(1 ex, 1979-VII-22)
- ③⑨チャボハナカミキリ  
*Anoplodera misella* (BATES)  
広く分布し、各谷に普通。しかし早は非常に少ない。  
横行谷(4 exs, 1980-VII-27)
- ④⑩ミヤマクロハナカミキリ *A. excavata* (BATES)  
分布は広く各谷で見られるがあまり多くない。  
赤西谷(2 exs, 1982-VI-6)  
戸倉峠(3 exs, 1979-VII-29)
- ④⑪ルリハナカミキリ *A. cyanea* (GEBLER)  
当地区で少ない。  
坂の谷(1 ex, 1971-VI-27 黒田祐一)の報告が有る。  
坂の谷(1 ex, 1981-VII-26 相坂)
- ④⑫ミヤマルリハナカミキリ  
*A. azumensi* (MATSUSHITA et TAMANUKI)  
各谷のカエデ花上に多数見られる。特に赤西谷に多産する。  
赤西谷(36 exs, 1981-V-9・24 exs, 1982-V-9)
- ④⑬ヒメアカハナカミキリ *A. pyrha* (BATES)  
分布は広いが少ない。  
横行谷(1 ex, 1980-VII-20)  
杉ヶ沢(2 exs, 1981-VII-19)
- ④⑭ツヤケシハナカミキリ *A. scotodes* (BATES)  
いずれの谷でも広く分布する。  
赤西谷(3 exs, 1982-VI-6)
- ④⑮アカハナカミキリ  
*A. rubra succedanea* (LEWIS)  
7月から8月末まで各地に広く分布する。  
赤西谷(2 exs, 1979-VIII-5)  
横行谷(1 ex, 1980-VII-27)
- ④⑯ベニバハナカミキリ  
*Paranaspia anaspoides* (BATES)  
当地域では少ない種である。  
音水谷(1 ex, 1959-VI-21 高橋寿郎)の報文がある。
- ④⑰クロハナカミキリ *Leptura aethiops* PODA  
当地域で全体黒色の個体と前胸の赤色の個体の2型が採集されている。後者をムネアカクロハナカミキリと呼ばれているが、亜種でなく1型と考えられる。音水谷(2 exs, 1982-VII-18)
- ④⑱①ヤツボシハナカミキリ  
*L. arcuata mimica* BATES
- ④⑱②ツマガロハナカミキリ  
*L. arcuata tsumagurohana* OHBAYASHI  
各谷に普通。  
赤西谷(1 ex, 1979-VI-15)  
現在の知見ではヤツボシハナカミキリとツマガロハナカミキリは別亜種として区別されている。当地区で採集されている個体はほとんどが、ツマガロハナカミキリである。
- ④⑲ハネビロハナカミキリ  
*L. latipennis* (MATSUSHITA)  
少ない種である。  
関宮町(1 ex, 1980-VI-22)土場で飛翔中を採集した。
- ④⑳ヨツズジハナカミキリ  
*L. ochraceofasciata* (MOTSHULSKY)  
広く分布する普通種  
赤西谷(4 exs, 1979-VIII-5)  
戸倉峠(6 exs, 1979-VII-22)

## ⑤①カタキハナカミキリ

L. femoralis (MOTSCHULSKY)

少ない種のようなのである。

坂の谷(1ex, 1971-VI-27, 黒田祐一)の報文がある。

## ⑤②オオヨツスジハナカミキリ

Megaleptura regalis (BATES)

広く分布している。鞘翅が変化に富む。

赤西谷(2exs, 1982-VIII-22)

音水谷(3exs, 1981-VII-27)

横行谷(2exs, 1980-VII-20)

## ⑤③セアカハナカミキリ(クロオオハナカミキリ)

M. thoracica CREUTZER

ブナ帯で発生するも、当地区では少ない。

氷の山(1961-VIII-1, 藤田)の報告がある。

## ⑤④フタスジハナカミキリ Nakanea vicaria (BATES)

普通種であるが、当地域では個体数は少ない。

横行谷(1ex, 1980-VII-20)

## ⑤⑤カエデノヘリグロハナカミキリ(クロスジハナカミキリ) Eustrangalis distenoides BATES

中型のカミキリとしては、発生が早く、5月上旬

にカエデ花上で採集される。

赤西谷(1ex, 1982-V-9)

## ⑤⑥ヒゲジロハナカミキリ

Japanostrangalia dentatipennis (PIC)

広く分布している。7月に花上によく見られる。

音水谷(2exs, 1982-VII-18)

横行谷(3exs, 1980-VII-20)

戸倉峠(2exs, 1979-VII-22)

## ⑤⑦アオバホソハナカミキリ

Strangalomorpha tenuis SOLSKY

横行谷でのみ発見出来た。

横行谷(4exs, 1981-V-30)

## ⑤⑧ニンフホソハナカミキリ

Parastrangalis nymphula (BATES)

7月花上に見られ、下記2種と共に、同環境で見

られる。

赤西谷(6exs, 1979-VII-22)

道谷(4exs, 1979-VII-22)

## ⑤⑨ニョウホウホソハナカミキリ P. lesnei (PIC)

横行谷(2exs, 1980-VII-20)

道谷(1ex, 1979-VII-22)

## ⑤⑩タテジマホソハナカミキリ

P. shikokensis (MATSUSHITA)

道谷(3exs, 1979-VII-22, 2exs, 1980-VII-20)

## ⑤⑪ミヤマホソハナカミキリ

Strangalia contracta BATES

やや日陰のノリウツギの花上で下記2種と共に見られる。

赤西谷(1ex, 1979-VII-15, 2exs, 1981-VII-27)

## ⑤⑫ハコネホソハナカミキリ

S. hakonensis MATSUSHITA

赤西谷(1ex, 1981-VII-27)

横行谷(2exs, 1980-VII-20)

## ⑤⑬ホソハナカミキリ S. hosohana OHBAYASHI

赤西谷(2exs, 1981-VII-27)

横行谷(1ex, 1979-VI-24)

## ⑤⑭キヌツヤハナカミキリ

Corenys sericata BATES

ブナ帯の花上で見られるが少ない。

赤西谷(1ex, 1968-VII-21 黒田祐一)の報文がある。

## ⑤⑮ヒゲジロホソコバナカミキリ

Necydalis odai HAYASHI

氷の山で毎年、少数採集されているらしい。

坂の谷(1980-VII-27 小倉)

## ⑤⑯オオホソコバナカミキリ N. solida BATES

この種も氷の山で少数採集されているらしいが、

筆者は未採集である。

## VI カミキリ亜科 Cerambycinae

## ⑥①アオスジカミキリ

Xystrocera globosa (OLIVIER)

1980年3月に大屋町、杉ヶ沢で採集した。ネムノキより、同年5月~6月に38頭羽脱した。分布は広いようである。

## ⑥②ミヤマカミキリ Massicus raddei (BLESSIG)

人家近くのクヌギ林で多数発生するが、当地区では少ない。

## ⑥③トビイロカミキリ

Allotraeus sphaerioninus BATES

横行谷(2exs, 1980-VI-1, 1ex, 1980-VII-20)

赤西谷(1ex, 1982-VI-13, 相坂)

## ⑥④ベーツヤサカミキリ

Leptoxenus ibidiiformis BATES

非常に稀な種のようなのである。

氷の山(1ex, 1973-V-27 採集者不明)が報告されている。

## ⑥⑤ヨツシカミキリ

Stenygrinum quadrinotatum BATES

普通種であるが、当地区では、あまり見られない。

音水谷(1ex, 1981-VII-11)引原ダムの灯火にも、

少数飛来する。

⑦②アメイロカミキリ *Stenodryas clavigera* BATES  
少ない種のようなのである。氷の山で高橋寿郎氏が採  
集されている。

⑦③ヨコヤマヒメカミキリ

*Ceresium holophaeum* BATES

島しょ性のカミキリムシで、当地で見られるも、  
少ない種である。

赤西谷(1ex, 1981-VIII-24)

引原ダム(1ex, 1982-IX-18)

⑦④トワダムモンメダカカミキリ

*Stenhomalus lightii* GRESSITT

少ない種と思われる。

赤西谷(1980-VI-1 小倉)の報告がある。

⑦⑤タイワンメダカカミキリ

*S. taiwanus* MATSUSHITA

広く分布していると思われるが、あまり報告を聞  
かない。サンショウの木のスウィーピングで得た。  
横行谷(1ex, 1982-VI-27)

⑦⑥カッコウメダカカミキリ *S. cleroides* BATES

関宮町の集材所で飛翔中を採集した。

関宮町(1ex, 1978-VI-25)

氷の山(1ex, 1971-IV-16 辻)の報告がある。

⑦⑦タカオメダカカミキリ

*S. takaosanus* OHBAYASHI

同属の中でもっとも小形の種であるので、見つけ  
にくいと思われる。赤西谷で少数採集されている。  
赤西谷(2exs, 1971 畑中)

〃(1980-V-4 小倉)の記録がある。

⑦⑧クロサワヒメコバネカミキリ

*Epania septemtrionalis* HAYASHI

過去、三室山で畑中、遊磨、大倉、等の諸氏によ  
り少数、採集されている。筆者も音水谷の伐採地  
に放置されている広葉樹の小枝上より、1♀得た。  
音水谷(1ex, 1982-VI-20)

同年、6月下旬に赤西谷でも得られたらしい。

⑦⑨ヤマトチビコバネカミキリ

*Leptepania japonica* (HAYASHI)

赤西谷(1980-VI-4 小倉)の報告がある。

⑧⑩コボトケヒゲナガコバネカミキリ

*Molorchus kobotokensis* OHBAYASHI

春先、カエデ花上に見られるも少ない種と思われ  
る。

三室山(1♀, 1970-V-1. 2exs, 1970-V-10.

4exs, 1970-V-28. 2exs, 1971-V-1. 1♂,

1971-V-17 畑中)の報告がある。毎年、少数

ではあるが、赤西谷、音水谷で得られている。

赤西谷(1980-V-4 小倉)がある。

⑧⑪ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ

*M. nitidus* OBIKA

この種も少数ずつではあるが、毎年採集されてい  
る。

三室山(1♀, 1970-V-1. 1♂, 1970-V-10.

1ex, 1970-V-28 畑中)

氷の山(1ex, 1972-V-5 辻)

赤西谷(3exs, 1981-V-9)

⑧⑫オダヒゲナガコバネカミキリ

*M. gracilis* (HAYASHI)

少ない種と思われる。

三室山(1♀, 1971-V-1 畑中)の記録がある。

⑧⑬コジマヒゲナガコバネカミキリ

*M. kojimai* (MATSUSHITA)

ヒゲナガコバネカミキリ属の中で、もっとも普通  
に採集されている。同時に多数採集される事があ  
る。

赤西谷(14exs, 1981-V-9. 2exs, 1982-V-9)

〃(1ex, 1982-VI-6 吉田)

⑧⑭タケウチヒゲナガコバネカミキリ

*M. takeuchii* OHBAYASHI

非常に稀な種である。当会員である小倉滋氏によ  
り得られた。

赤西谷(1ex, 1979-V-22 小倉)

⑧⑮トラフホソバネカミキリ

*Thranis variegatus* BATES

発生数は少ないと思われるが、各谷に広く分布し  
ている様子。

氷の山(1ex, 1940-VII-19 岡田)

三室山(1ex, 1973-VII-1 畑中)

〃(3exs, 1973-VII-19 大倉)

等があり、筆者も音水谷(1ex, 1981-VII-23)で  
採集した。

⑧⑯クスベニカミキリ

*Pyrestes haematicus* PASCOE

各谷に広く分布している。

坂の谷(6exs, 1981-VII-26)

戸倉峠(18exs, 1979-VII-22)

⑧⑰ルリボシカミキリ *Rosalia batesi* HAROLD

各谷に普通に見られる。赤西谷に産する個体は斑  
紋異常が多い。

赤西谷(12exs, 1979-VII-5. 6exs, 1981-VII-27)

横行谷(4exs, 1980-VII-13)

⑧⑱アオカミキリ

*Chelidonium quadricolle* BATES

当地区では少ない。

氷の山(2exs, 1971-Ⅶ-17 辻)の記録がある。

⑧9 ミドリカミキリ

*Chloridolum viride* (THOMSON)

普通種であるが、各谷共、個体数は少ない。

音水谷(1ex, 1982-Ⅶ-18)

横行谷(1ex, 1980-Ⅶ-20)

⑨0 オオアオカミキリ *C. thaliodes* BATES

赤西谷の観察では、夕方、サワグルミ生木上で、♂♀共、群らがついていた。交尾中の個体も見られた。少ない種であるが、一度に多数採集出来る時がある。

赤西谷(9exs, 1980-Ⅷ-24)

横行谷(6exs, 1980-Ⅶ-27)

⑨1 ヒメスギカミキリ

*Palaeocallidium rufipenne* (MOTCHULSKY)

普通種でスギの伐採木上に多数群らがる。

赤西谷(5exs, 1980-Ⅵ-11. 5exs, 1982-V-9)

⑨2 チャイロホソヒラタカミキリ

*Phymatodes testaceus* (LINNAEUS)

[クビアカルリヒラタカミキリ *P. testaceus* var. *variabilis* (LINNAEUS)]

道谷林道の道路脇に積まれた、薪材に多数発生していた。同地区で発生している個体は、大部分が鞘翅が藍色で美しい、クビアカルリヒラタカミキリであり、原型のチャイロホソヒラタカミキリは、非常に少なかった。

道谷林道(28exs, 1982-Ⅵ-27)

赤西谷(1ex, 1982-Ⅵ-20 花岡)

⑨3 シロオビカミキリ *P. albicinctus* BATES

ブドウ類のツル上に、次種と共に見られる。分布は広い。

赤西谷(6exs, 1980-Ⅵ-8)

横行谷(3exs, 1980-Ⅵ-1)

⑨4 アカネカミキリ *P. maaki* (KRAATZ)

赤西谷(4exs, 1980-Ⅵ-8. 2exs, 1980-Ⅵ-15. 15exs, 1982-V-17)

⑨5 トラフカミキリ

*Xylotrechus chinensis* (CHEVROLAT)

クワの古木上に見られ、特に道谷林道に多い。

道谷林道(7exs, 1980-Ⅶ-20. 4exs, 1982-Ⅷ-8)

横行谷(6exs, 1982-Ⅷ-8)

⑨6 ヤノトラカミキリ *X. yanoi* GRESSITT

氷の山付近で見られる。少ない種である。

横行谷(1ex, 1980-Ⅸ-28) 集材所のエノキに飛来した。同地で相坂氏は、材上で死体の本種を得

ている。

横行谷(1ex, 1980-Ⅸ-23)

⑨7 ツマキトラカミキリ *X. clarinus* BATES

普通種である本種も、当地区では、少ない。

赤西谷(1ex, 1979-Ⅶ-15)

⑨8 ウスイロトラカミキリ

*X. cuneigennis* (KRAATZ)

各谷に広く分布し、個体数も多い。

赤西谷(10exs, 1979-Ⅶ-15)

⑨9 クビアカトラカミキリ *X. rufilius* BATES

各谷に広く分布し、個体数も多く、材上をすばやく走っている。

赤西谷(10exs, 1979-Ⅷ-5)

関宮町(12exs, 1980-Ⅵ-22)

⑩0 ブドウトラカミキリ *X. pyrrhoderus* BATES

時にブドウに害を与える本種も、当地区では少ない。

横行谷(1ex, 1980-X-5. 1ex, 1980-X-8)

⑩1 ムネマダラトラカミキリ *X. grayii* (WHITE)

少ない種であるが、赤西谷では、毎年少数ではあるが採集されている。

赤西谷(4exs, 1980-Ⅵ-8. 2exs, 1980-Ⅵ-15)

杉ヶ沢(1ex, 1981-Ⅶ-19)

⑩2 ニイジマトラカミキリ *X. emaciatius* BATES

各谷に広く分布する。

赤西谷(10exs, 1979-Ⅶ-15)

坂の谷(7exs, 1981-Ⅷ-23)

⑩3 ヤマトシロオビトラカミキリ

*Kazuoclytus lautoides* (HAYASHI)

赤西谷のカエデ花上より、毎年少数採集されている。

赤西谷(1ex, 1981-V-9)

〃 (2exs, 1982-V-9. 花岡)

⑩4 シラケトラカミキリ *Clytus melaenus* (BATES)

各谷に広く分布する。

赤西谷(3exs, 1980-Ⅵ-15)

戸倉峠(3exs, 1982-V-23)

⑩5 キンケトラカミキリ *C. aulipilis* (BATES)

赤西谷に多く見られ、ケヤキ材上やカエデ花上に見られる。

赤西谷(26exs, 1980-Ⅵ-11. 5exs, 1982-V-9)

⑩6 キスジトラカミキリ

*Cyrtoclytus caproides* (BATES)

広く分布する普通種。

赤西谷(13exs, 1979-Ⅶ-15)

道谷林道(5exs, 1979-Ⅶ-22)

## ⑩⑦アカネクスジトラカミキリ

*C. monticallisus* KOMIYA

小宮次郎氏により記載されたトラカミキリの新種で、鳥取県の高鉢山で那須、山治、両氏により発見された。兵庫県でも氷の山坂の谷林道で細川光幸氏により、同地採集のエゾヒノキより1980-IV-28に羽化に成功されている。大阪市在住の大平氏が報告されている。

## ⑩⑧アカネトラカミキリ

*Brachyelytus singularis* KRAATZ

以前はあまり見られない、比較的、稀な種であった。本種も1982年に赤西谷に於て、多数発生した。赤西谷(2exs, 1982-V-5. 22exs, '82-V-9. 5exs, '82-VI-6)

## ⑩⑨ヨコヤマトラカミキリ

*Epiclytus yokoyamai* (KANO)

非常に少ない種で、当地区で採集されている個体も数個体のみと思われる。

氷の山(1ex, 1972-VI-11 遊磨)

赤西谷(1ex, 1982-VI-6 三木)

## ⑩⑩クロトラカミキリ

*Chlorophorus diadema* (MOTSCHULSKY)

subsp. *kurotora* HAYASHI

当地区では稀な種である。

赤西谷(1ex, 1971-VIII-8 黒田祐一)の記録がある。

## ⑩⑪エグリトラカミキリ

*C. japonicus* (CHEVROLAT)

普通種で各谷に広く分布する。

赤西谷(5exs, 1979-VI-15)

⑩⑫トウキョウトラカミキリ *C. yedoensis* (KANO)

非常に少ない種と思われる。

三室山(1ex, 1971-V-2. 畑中)の記録が有る。

⑩⑬キイロトラカミキリ *C. notabilis* (PASCOE)

普通種で各谷の道路添の薪上より、多数発生している。

赤西谷(5exs, 1980-VI-22)

## ⑩⑭フタオビミドリトラカミキリ

*C. muscosus* (BATES)

暖地性の種で、当地区では、各谷に広く分布している。

赤西谷(3exs, 1979-VII-29. 3exs, '79-VIII-19)

横行谷(15exs, 1981-VIII-20)

⑩⑮ホソトラカミキリ *Rhaphuma xenisca* (BATES)

広く分布している。

赤西谷(3exs, 1982-V-9)

横行谷(2exs, 1980-V-4)

⑩⑯ヒメクロトラカミキリ *R. diminuta* (BATES)

いずれの谷でも分布し、カエデ花上やケヤキ枯枝上に多数見られる。

赤西谷(2exs, 1980-VI-15. 7exs, 1981-V-7. 15exs, 1982-V-23)

横行谷(3exs, 1980-V-4)

## ⑩⑰トゲヒゲトラカミキリ

*Demonax transilis* (BATES)

各谷に広く分布し、発生期間も非常に長い。

赤西谷(10exs, 1979-VII-22)

横行谷(5exs, 1980-VII-6)

## ⑩⑱シロトラカミキリ

*Paraclitus excultus* BATES

各谷のカエデ花より普通に採集される。

赤西谷(5exs, 1982-V-9. 6exs, '82-VI-6)

坂の谷(5exs, 1982-V-23)

## ⑩⑲アカジマトラカミキリ

*Anaglyptus bellus* MATSUMURA et MATSUSHITA

横行谷でケヤキ大木の伐採木で多数採集した事があるし、附近の草花上でも採集出来た。赤西谷では、1978年に高橋寿郎氏が採集され発表されている。尚、赤西谷で本年9月より10月に、かなり発生し、採集されている。

## ⑩⑳マツシタトラカミキリ

*A. matsushitai* HAYASHI

氷の山周辺でのみ見られ個体数は少ない。氷の山で高橋匡氏が採集されている。その他、坂の谷で2exs, 赤西谷で1ex, 黒田祐一氏が採集、報告されている。筆者も1ex, 戸倉峠で1981-X-11に広葉樹の伐採木上で得ている。時期的に非常に遅い記録である。

## ⑩㉑トガリバアカネトラカミキリ

*A. niponensis* BATES

赤西谷でのみ見られた。

赤西谷(1ex, 1982-V-23. 2exs, '82-VI-6)

その他、同行の相坂氏、吉田氏、花岡氏も採集されている。

## ⑩㉒キオビトラカミキリ(スギノアカネトラカミキリ)

*A. subfasciatus* PIC

あまり多くないが、広く分布している。全体の色彩の個体変異がいちじるしく、面白い。

赤西谷(3exs, 1982-V-23. 2exs, 1982-VI-6)

横行谷(1ex, 1980-V-4)

⑩㉓ホタルカミキリ *Dere thoracica* WHITE

広く分布し、各谷で普通に見られ、個体数も多い。

赤西谷(8exs, 1980-VI-22)

横行谷(5exs, 1979-V-4)

⑭ベニカミキリ

*Purpuricenus temminckii* (GUÉRIN-MÉNEVILLE)

平地、低山地の種で、5月末より6月下旬によく見られ、クリの花上に多いが、当地域では、あまり採集されていない。

音水谷(1ex, 1976-V-23 相坂)

⑮ヘリグロベニカミキリ

*P. spectabilis* MOTSCHULSKY

当地では前種より、よく採集され、広く分布している。

赤西谷(2exs, 1980-VII-11. 2exs, 1982-V-23)

⑯タキグチモモブトホソカミキリ

*Cleomenes takiguchii* OHBAYASHI

暖地性の種で、赤西谷で採集されているが、稀種である。

赤西谷(1ex, 1970-VII-26. 8exs, 1971-VII-25. 黒田祐一)

赤西谷(3exs, 1971-VII-18 畑中)

VII フトカミキリ亜科 Lamiinae

⑰シロオビゴマフカミキリ

*Falsomesosella gracilior* (BATES)

分布広く、各谷の粗朶の叩き網で得られる。

赤西谷(1ex, 1982-VII-8)

音水谷(1ex, 1981-VIII-23)

⑱ゴマフカミキリ

*Mesosa myops japonica* (BATES)

各谷に広く分布している。普通種である。発生期間もだらだらと長い。

赤西谷(2exs, 1979-VII-15)

音水谷(1ex, 1981-VII-12)

横行谷(2exs, 1980-VI-1)

⑲ウスアオゴマフカミキリ (タテスジゴマフカミキリ) *M. senilis* (BATES)

いずれの谷でも普通に採集されている。

赤西谷(2exs, 1982-VI-7)

音水谷(2exs, 1982-VII-18)

坂の谷(2exs, 1981-VIII-23)

横行谷(1ex, 1980-VII-27)

⑳ナガゴマフカミキリ *M. longipennis* (BATES)

最普通種で各谷に見られ、出現期も長い。

赤西谷(3exs, 1980-VII-20)

横行谷(3exs, 1980-VII-27)

㉑カタジロゴマフカミキリ *M. hirsuta* (BATES)

各谷に広く分布し、広葉樹の薪などで見られる。

赤西谷(2exs, 1980-VII-20)

音水谷(3exs, 1981-IX-6)

坂の谷(1ex, 1981-VIII-23)

横行谷(4exs, 1980-VII-27)

㉒シナノクロフカミキリ

*Asaperda agapanthina* (BATES)

各谷のサワグルミの伐採枝上で見られる。

赤西谷(1ex, 1981-VI-23. 1ex, 1980-VI-28.

4exs, 1981-VII-12)

㉓キクスイモドキカミキリ *A. rufipes* (BATES)

広く分布している普通種

赤西谷(4exs, 1979-VI-10)

音水谷(2exs, 1981-VII-12)

㉔コブスジサビカミキリ

*Atimura japonica* (BATES)

あまり採集されていない。

赤西谷(1ex, 1979-VII-15)

㉕クビジロカミキリ

*Xylariopsis mimica* (BATES)

少ない種で赤西谷でのみ採集されている。

赤西谷(1ex, 1980-IV-13)

◊ (2exs, 1980-VI-21 渡辺昭彦)

◊ (1ex, 1980-VII-5 那須敏)

又、同地のツルウメモドキ枯枝より山地治氏が同年7月~9月に多数羽化脱出させている。

㉖クリチビカミキリ

*Sybra sakamotoi kuri* OHBAYASHI et HAYASHI  
小型種の為あまり採集されていない。

氷の山(1ex, 1972-VI-21 遊磨. 3exs, 1973-VII-7 遊磨、大倉)の記録がある。

㉗アヤモンチビカミキリ *S. ordinata* BATES

暖地の沿海性の種で当地区で発見されているが稀種である。氷の山で高橋匡氏が採集されている。

㉘キボシチビカミキリ

*S. flavomaculata* BREUNING

三木市の高橋久夫氏の私信によると1981-III-21に赤西谷より持ち帰ったモミの古材より同年5月22日羽化脱出したとの事である。その他、同谷で岡山県的那須氏が(1♀, 1979-VI-8羽化)の報告をされている。少ない種と思われる。

㉙ハスオビヒゲナガカミキリ

*Cleptomtopus bimaculatus* (BATES)

叩き網等で採集されているが、少ない。

三室山(1ex, 1973-VII-5 大倉. 1ex, 1973-VII-8 畑中)等の記録報告がある。

㉚ドウボツカミキリ



*Pseudocalamobius japonicus* (BATES)

個体数は多くないが、各谷で見られる。

赤西谷(1ex, 1982-VI-20. 1ex, 1982-VII-18)

坂の谷(1ex, 1982-V-23 相坂)

## ④① マルモンサビカミキリ

*Pterolophia angusta* (BATES)

同属中では少ない種である。

赤西谷(1ex, 1979-VII-15)

氷の山で高橋寿郎氏が採集、報告されている。

④② ヒメナガサビカミキリ *P. leiopodina* (BATES)

広く分布する普通種。粗朶上に見られる。

赤西谷(5exs, 1980-V-13. 2exs, 1980-V-20)

## ④③ クリサビカミキリ

*P. castaneivora* OHBAYASHI et HAYASHI

稀な種であり記録がない。

音水谷(6exs, 1981-VII-19)

氷の山(3exs, 1973-VI-25. 1ex, 1973-VII-7

遊磨)の報告がある。

④④ アトジロサビカミキリ *P. zonata* (BATES)

各谷に広く分布する種で個体数も多い。

赤西谷(5exs, 1979-VI-10. 3exs, 1981-VII-12)

音水谷(3exs, 1981-VII-12)

## ④⑤ シロオビサビカミキリ (エゾサビカミキリ)

*P. japonica* BREUNING

当地区では同属中少ないものである。

赤西谷(2exs, 1979-VI-10)

音水谷(2exs, 1981-VII-11)

## ④⑥ トガリシロオビサビカミキリ

*P. caudata* (BATES)

広く分布する普通種で、発生期間も長い。灯火にもよく飛来する。

赤西谷(9exs, 1979-VII-9)

音水谷(7exs, 1980-VII-10)

## ④⑦ アトモンサビカミキリ

*P. granulatus* (MOTSCHULSKY)

普通種で各谷に見られる。

赤西谷(4exs, 1979-VI-10)

音水谷(5exs, 1979-VI-17)

横行谷(8exs, 1980-V-18)

④⑧ ナカジロサビカミキリ *P. jugosa* (BATES)

同属中少ない種であるが、分布は広い。

横行谷(1ex, 1982-VIII-8)

## ④⑨ クワサビカミキリ

*Mesosella simiola* (BATES)

各谷の広葉樹粗朶上で見られるも少ない。

横行谷(1ex, 1981-V-30)赤西谷、音水谷でも採集

されている。

## ④⑩ ニイジマチピカミキリ

*Egesina bifasciana* MATSUSHITA

三室山(7exs, 1973-VII-5大倉)の記録がある。

## ④⑪ ヒメコブヤハズカミキリ

*Parechthistatus gibber* (BATES)

分布広く、各谷に産するが、個体数は多くない。しかし赤西谷で1981年と'82年にトチノキの伐採木上で多数得られた。

赤西谷(8ex, 1981-V-26. 3exs, '81-VI-4. 1ex, '81-VI-23)

音水谷(1ex, 1981-VII-11)

横行谷(1ex, 1980-V-18. 1ex, '80-VII-20.

1ex, '80-VIII-3)

## ④⑫ イタヤカミキリ

*Mecynippus pubicornis* (BATES)

少ない。音水谷のヤナギ生木上で交尾中を発見したが下草に落下し、1♀のみ採集出来た。

音水谷(1ex, 1981-VIII-2)

## ④⑬ ヒゲナガカミキリ

*Monochamus grandis* (WATERHOUSE)

広く分布していると思われるが個体数は少ないようだ。

音水谷(1ex, 1981-IX-13)

引原ダム(1ex, 1982-IX-18)

赤西谷でも発見したが下草に隠れ見失しまった。'82年に赤西谷土場でかなり採集されている様子。

④⑭ マツノマダラカミキリ *M. alternatus* (HOPE)

低山地に普通の本種も当地区では少ない。氷の山で高橋匡氏が採集され報告されている。

## ④⑮ ヒメヒゲナガカミキリ

*M. subfasciatus* (BATES)

普通種で各谷共、広く分布している。

赤西谷(4exs, 1979-VIII-19)

音水谷(6exs, 1980-VIII-3)

横行谷(4exs, 1980-VII-27)

## ④⑯ ゴマダラカミキリ

*Anoplodera malasiaca* (THOMSON)

低地に普通に産するが、当地区ではあまり採集例を聞かない。

氷の山(1ex, 1971-VII-16. 1ex, '71-VII-17 辻)がある。

## ④⑰ センノキカミキリ (センノカミキリ)

*Acalolepta luxuriosa* BATES

普通種ではあるが、当地区では個体数は少ない様だ。

- 音水谷(1ex, 1981-IX-6. 3exs, '81-IX-13)
- ⑬ピロウドカミキリ  
*Acalolepta fraudatorix* (BATES)  
各谷に広く分布し、個体数も多い。  
赤西谷(3exs, 1979-VIII-5)  
音水谷(2exs, 1981-VII-19)  
坂の谷(3exs, 1981-VII-27)
- ⑭ウグイスピロウドカミキリ  
*A. olivacea* (BREUNING)  
次種の1型と思われるが、今回別種として記した。  
赤西谷(1ex, 1980-VI-8. 1ex, '80-VIII-3)  
坂の谷(2exs, 1981-IX-13)
- ⑮ニセピロウドカミキリ *A. sejuncta* (BATES)  
ピロウドカミキリよりは個体数は少ないけれど、各谷に広く分布する普通種である。  
赤西谷(2exs, 1980-IX-14)  
音水谷(2exs, 1981-IX-13)  
横行谷(2exs, 1980-VIII-3)
- ⑯ヒメピロウドカミキリ *A. degenera* (BATES)  
鉢伏山頂で北山昭、渡辺一雄両氏により、1979年8月25日に採集され報告されている。
- ⑰ヤハズカミキリ  
*Uraecha bimaculata* (THOMSON)  
広く分布するがあまり数は多くない。  
音水谷(1ex, 1981-IX-13)  
坂の谷(1ex, 1981-VIII-2)  
横行谷(1ex, 1980-VIII-3)
- ⑱ヨコヤマヒゲナガカミキリ  
*Dolichoprosopus yokoyamai* (GRESSITT)  
ブナ帯に現われる稀種で氷の山で高橋匡氏が採集されている。
- ⑲チャボヒゲナガカミキリ  
*Xenicotela pardalina* (BATES)  
あまり多くない。  
赤西谷(1ex, 1980-VII-12)
- ⑳キボシカミキリ *Psacotha hiralis* (PASCOE)  
各谷のクワ古木に多産する。氷の山周辺に特に多い。  
赤西谷(1ex, 1979-VIII-5)  
坂の谷(3exs, 1981-VII-27)  
横行谷(2exs, 1980-VII-20)
- ㉑クリイロシラホシカミキリ  
*Nanohammus rufescens* (BATES)  
少ない種である。氷の山周辺でのみ採集されている。  
氷の山(1ex, 1972-VI-21 遊磨)
- 坂の谷(1ex, 1980-VII-27 小倉. 1ex, 1982-V-23 相坂)の記録がある。
- ㉒シロスジカミキリ  
*Batocera lineolata* (CHEVROLAT)  
低山地の普通種であるが当地ではあまり採集記録がない。  
引原ダム(1ex, 1981-VII-10 相坂)ダムの灯火に飛来したらしい。
- ㉓ヒゲナガゴマフカミキリ  
*Palimna liturata* (BATES)  
各谷の伐採木上で普通に見られる。特に坂の谷に多産する。  
赤西谷(3exs, 1980-VII-3)  
音水谷(2exs, 1981-IX-13)  
坂の谷(8exs, 1981-VII-26. 6exs, '81-VIII-23)
- ㉔セミスジコブヒゲカミキリ  
*Rhopopina lewisii* (BATES)  
当地区で少数採集されているも、少ない種。  
氷の山(1ex, 1973-VI-23 大倉)  
三室山(1ex, 1973-VII-5 大倉)の記録報告がある。筆者も当地区で未採集であるが、佐用郡内で採集のサクラ古木より羽化脱出させた経験がある。
- ㉕ムネホシシロカミキリ  
*Olenecamptus clarus* PASCOB  
氷の山周辺で採集されている。クワの木で発生しているので、各谷で採集されると思われる。  
氷の山(1956-VII-27 高橋寿郎)の記録がある。その他関宮町福定で小倉氏が1980年8月7日採集されている。
- ㉖タカサゴシロカミキリ *O. formosanus* PIC  
各谷に広く分布し、個体数も多い。  
赤西谷(15exs, 1979-VII-15. 8exs, 1980-VI-15)  
音水谷(3exs, 1981-VII-11)特に赤西谷に多産する様だ。1981年3月同地より持ち帰ったサワグルミ材より5月から6月に多数羽化脱出した。
- ㉗エゾナガヒゲカミキリ  
*Jezohammus nubilus* MATSUSHITA  
県初記録と思われる。1980年10月に横行谷より持ち帰った新しい材(アカメガシワ?)より1982年4月26日より5月12日の間に、多数羽化脱出した。'82年1月20日の材の割出しで10数頭を出したが、この時、材中には終令幼虫も同時に見られた。詳細な事項は別の機会に述べる事にする。
- ㉘ヒトオビアラゲカミキリ  
*Rhopaloscelis unifasciatus* (BLESSIG)

分布は広く各谷の粗朶上に見られる。

赤西谷(7exs, 1980-V-13)

音水谷(5exs, 1982-VI-20)

⑩⑦ フタオビアラゲカミキリ

*R. maculatus* (BATES)

音水谷のサワグルミ枯枝上で見られた。

音水谷(4exs, 1981-VII-11. 2exs, 1982-VI-20)

⑩⑧ ジュウジクロカミキリ

*Clytosemia pulchra* (BATES)

少ない種と思われる。

氷の山(4exs, 1972-VI-10 遊磨)

〃 (1ex, 1972-VI-11 遊磨)

⑩⑨ カッコウカミキリ

*Miccolamia cleroides* (BATES)

各谷で少数採集されている様だ。広く分布しているが個体数は少ない。

赤西谷(1ex, 1982-V-23)

音水谷(1ex, 1970-V-17 黒田祐一)の記録がある。

⑩⑩ チビコブカミキリ *M. verrucosa* (BATES)

氷の山で高橋寿郎氏が採集され報告されている。

少ない種と思われる。

⑩⑪ クリイロチビケブカカミキリ

*Terinaea atrofusca* (BATES)

稀種。氷の山(1ex, 1972-VI-21 遊磨)の記録がある。

⑩⑫ ホソヒゲケブカカミキリ

*Eupogoniopsis tenuicornis* (BATES)

この種も非常にめずらしい種である。

赤西谷(1♂, 1980-VI-21 山地)の記録報告がある。

⑩⑬ クモノスモンサビカミキリ

*Graphidessa venata* (BATES)

あまり多くないが各谷に分布している。枯枝上や粗朶上に少数見られる。筆者は1982年8月22日音水谷で発見するも見逃がしてしまった。赤西谷で高橋寿郎氏が採集されている。

⑩⑭ ハイイロツツクビカミキリ

*Cylindilla grisescens* (BATES)

氷の山でのみ少数採集されている。

氷の山(1ex, 1972-VI-19. 2exs, '72-VI-21

遊磨)

⑩⑮ ドイカミキリ *Doius divaricatus* (BATES)

各谷で見られるも少ない。

音水谷(1ex, 1981-VI-23. 1ex, 1982-VIII-22)

⑩⑯ キバネアラゲカミキリ

氷の山周辺のクワより発生している様子、少ない。

氷の山(3exs, 1972-VII-9. 1ex, '72-VII-17.

2exs, '72-VIII-3. 1ex, '72-VIII-10 辻)

関宮町福定(1980-VIII-7 小倉)の記録がある。

⑩⑰ シロオビチビカミキリ

*Sybrodiboma subfasciata* (BATES)

各谷に広く分布し、個体数も多い。

音水谷(14exs, 1981-VII-19. 10exs, 1982-VIII-22)

⑩⑱ ネジロカミキリ

*Pogonocherus seminiveus* (BATES)

氷の山で少数採集されているらしい。

⑩⑲ ゴイシモモトカミキリ

*Callapoecus quttatus* (BATES)

少ない種である。

音水谷(1ex, 1982-VIII-8)

その他三室山(2exs, 1972-VIII-6. 4exs, 1973-VII-22 畑中)の記録がある。

⑩⑳ スジマダラモモトカミキリ (ヒゲナガモモト

カミキリ) *Acanthocinus griseus* (FABRICIUS)

氷の山で高橋匡氏が採集されている。普通種であるが当地区では少ない。

⑩㉑ ナカバヤシモモトカミキリ

*Leiopus quttatus* (BATES)

稀種、氷の山で高橋匡氏が採集されている。

⑩㉒ ゴマダラモモトカミキリ

*L. stillatus* (BATES)

各谷に広く分布し、粗朶上に見られる。あまり多くない。

赤西谷(2exs, 1980-VIII-3. 1ex, 1982-VI-19)

音水谷(1ex, 1981-VII-19. 5exs, 1982-VII-18)

横行谷(1ex, 1980-VI-1)

⑩㉓ トゲバカミキリ

*Eryssamena saperdina* (BATES)

広く分布し各谷に普通に産する。広葉樹の伐採木上によく見られる。

赤西谷(2exs, 1980-VIII-3)

音水谷(1ex, 1980-VII-19. 3exs, 1982-VII-18)

横行谷(2exs, 1980-VII-27. 2exs, 1982-VIII-8)

⑩㉔ ケシカミキリ *Miaenia tonsa* (BATES)

氷の山(7exs, 1973-VII-25 遊磨)の記録がある。

⑩㉕ クロオビトゲムネカミキリ

*Estoliops fasciatus* MATSUSHITA

暖地性の種で当地区で採集されているのは驚異である。

氷の山(1ex, 1956-VII-27 高橋寿郎)の貴重な記

録がある。

⑬⑧ ガロアケシカミキリ

*Exocentrus galloisi* (MATSUSHITA)

各谷で採集されているが個体数は少ない。

赤西谷 (2exs, 1980-VII-20)

坂の谷 (2exs, 1971-VII-11 黒田祐一)

氷の山 (2exs, 1971-VII-18 辻)

⑬⑨ キッコウモンケシカミキリ

*E. testudineus* (MATSUSHITA)

分布は広く各谷の広葉樹の細枯枝上に見られる。

赤西谷 (1ex, 1980-V-13. 1ex, '80-VII-20)

横行谷 (1ex, 1980-V-25)

⑬⑫ アトモンマルケシカミキリ

*E. lineatus* (BATES)

この種も前種同様、同じ環境に見られる。

赤西谷 (1ex, 1979-VIII-19. 2exs, 1980-VII-20)

⑬⑪ クモガタケシカミキリ *E. fasciolatus* (BATES)

前2種と同環境に見られ各谷に広く分布している。

赤西谷 (1ex, 1979-VIII-19)

音水谷 (1ex, 1982-VI-27)

氷の山で1973年6月に遊磨、大倉両氏により、クワ材より多数羽化脱出に成功されている。又、三室山 (1ex, 1973-VII-18 大倉) の記録がある。

⑬⑩ シラオビゴマフケシカミキリ

*E. guttulatus* (BATES)

クワの細枯枝上によく見られ、各谷に分布していると思われる。

赤西谷 (1ex, 1979-VII-15)

横行谷 (6exs, 1980-VII-27)

⑬⑨ ムネモンヤツボシカミキリ

*Saperda tetrastigma* (BATES)

少ない種と思われる。分布は広い。

赤西谷 (1ex, 1982-VI-13)

音水谷 (1ex, 1982-VI-13) ツル性植物の葉上で発見した。又同地で1970-V-31. 黒田祐一氏の記録報告がある。

氷の山 (1ex, 1973-VII-17 辻) もある。

⑬⑧ ヤツメカミキリ *Eutetrappa ocelota* (BATES)

広く分布するが個体数は多くない。

赤西谷 (1ex, 1979-VII-15)

音水谷 (1ex, 1979-VIII-19)

横行谷 (2exs, 1980-VII-27)

⑬⑦ ハンノアオカミキリ *E. chrysochloris* (BATES)

普通種で6月~8月各谷に広く分布する。

赤西谷 (3exs, 1979-VI-15. 5exs, 1980-VI-8)

⑬⑥ フチグロヤツボシカミキリ

*Paraeutetrappa eximia* (BATES)

少ない種である。

赤西谷 (1ex, 1980-VI-22) 又、同地で1ex, 1980-VI-8 に相坂氏も採集されている。

⑬⑤ ニセシラホシカミキリ (ダイセンカミキリ)

*P. simulans* (BATES)

分布は広いがあまり多くない。

赤西谷 (1ex, 1981-VI-28)

音水谷 (2exs, 1982-VII-18)

坂の谷 (1ex, 1971-VIII-4 黒田祐一)

⑬④ トウキョウキモンカミキリ (オニグルミノキョウカミキリ) *Menesia flavotecta* (HEYDEN)

あまり多くないが、各谷に広く分布している。サワグルミ材より羽化させた事がある。

赤西谷 (1ex, 1980-VII-20. 2exs, 1982-VI-19)

横行谷 (2exs, 1980-VII-27)

⑬③ キモンカミキリ *M. sulphurata* (GEBLER)

最も普通に産し、各谷共、多産する。サワグルミ材より多数羽化脱出させた経験がある。

赤西谷 (11exs, 1980-VI-15)

音水谷 (2exs, 1981-VII-27)

⑬② カスガキモンカミキリ

*Paramenesia kasugensis* (SEKI et KOBAYASHI)

個体数は少ないが、各谷に広く分布している。

赤西谷 (1ex, 1982-VI-6 花岡)

音水谷 (3exs, 1981-VII-19. 1ex, 1982-VII-18)

坂の谷 (1ex, 1981-VII-26 相坂)

⑬① ハンノカミキリ

*Cagosima sanguinolenta* (THOMSON)

氷の山で採集記録がある。当地では筆者は未採集である。

⑬⑦ ラミーカミキリ *Paraglenea fortunei* SAUNDERS

普通種で各谷共広く分布している。

赤西谷 (2exs, 1979-VIII-5)

音水谷 (2exs, 1981-VII-19)

横行谷 (2exs, 1980-VII-27)

⑬⑥ アサカミキリ

*Thyestilla gebleri* (FALDERMANN)

アサの栽培禁止で全国的に個体数は激減した。当地区の記録も古い記録で中根猛彦氏等の採集記録がある。筆者も数十年前の峰山産の個体があるのみで、当地区では全滅したのではないとも思われる。

⑬⑤ シラホシカミキリ *Glenea relictta* (PASCOE)

各谷に広く分布し、6月~8月多数見られる。

赤西谷 (3exs, 1981-VI-23)

音水谷(4exs, 1981-VII-27)

②⑩クロニセリソゴカミキリ

*Eumecocera unicolor* (KANO)

当地域では少ない種と思われる。

氷の山(1ex, 1966-V-6 畑中)の記録がある。

②⑪セミスジニセリソゴカミキリ

*E. trivittata* (BREUNING)

赤西谷でのみ採集する事が出来た。各谷共あまり多くないようだ。

赤西谷(1ex, 1979-VI-15. 2exs, 1980-VI-8)

②⑫シラホシキクスイカミキリ *E. anomala* (BATES)

少ない種のように、あまり記録報告を聞かない。

赤西谷(1ex, 1980-VI-22)

坂の谷(1ex, 1980-VII-27 小倉)

②⑬コジマベニスジカミキリ

*Nipponostenostola pterocaryai* (HAYASHI)

赤西谷でのみ発見されている。サワグルミ伐採木上によく飛来して来る。

赤西谷(3exs, 1980-VI-8. 2exs, 1982-VI-4. 2exs, 1982-VI-6)

②⑭イッシキキモンカミキリ

*Glenea centroguttata* FAIRMAIRE

稀らしい種であるが、当地区では広く分布している。

赤西谷(1ex, 1980-IX-14. 2exs, '80-IX-21. 1ex, '80-IX-27)をクワの葉上で採集した。横行谷で1980年10月8日に採集した、クワ材より翌年の1981年6月24日から7月5日の間に合計38個体も羽化脱出した。又相坂氏は引原ダム灯火採集で飛来した個体を採集されている。引原ダム(1ex, 1981-VII-10. 1ex, 1982-VII-7. 相坂)以上のように、同地区ではかなりの個体が発生しているものと思われる。

②⑮キクスイカミキリ

*Phytoecia rufiventris* GAUTIER

筆者はまだ当地区で採集した事がないが、氷の山周辺での記録がある。

②⑯ヨツキボシカミキリ *Epiglenea comes* BATES

普通種で各谷に広く分布し、個体数も多い。

赤西谷(6exs, 1979-VII-15)

音水谷(12exs, 1979-VI-17)

②⑰ヘリグロリンゴカミキリ

*Nupserha marginella* (BATES)

広く分布し、各谷共普通に産する。飛翔中をよく採集されている。

赤西谷(3exs, 1979-VI-10)

音水谷(2exs, 1982-VII-18)

杉ヶ沢(3exs, 1981-VII-20)

②⑱ヒメリソゴカミキリ (フチグロチャバネリンゴカミキリ) *Oberea hebescens* BATES

各谷に広く分布するも、個体数は少ない。

音水谷(1ex, 1959-V-21 高橋寿郎)

氷の山(2exs, 1971-VII-17. 1ex, '71-VII-18辻)

②⑲ホソキリンゴカミキリ *O. inclusa* PASCOE

各谷共に分布はしているが、個体数は少ない。

赤西谷(1ex, 1979-VI-17) 又黒田祐一氏は1971-VII-11に赤西谷で採集され報告されている。

氷の山(1ex, 1971-VII-16. 1ex, '71-VII-17 辻)の記録もある。

②⑳ニセリソゴカミキリ *O. mixta* BATES

少ない種である。

横行谷(1ex, 1980-VI-1)

氷の山で高橋匡氏の記録がある。

②㉑リンゴカミキリ *O. japonica* (THUNBERG)

当地区で少ない種と思われる。氷の山の記録がある。

②㉒ホソツツリンゴカミキリ

*O. nigriventris* (BATES)

少ない種である。高橋寿郎氏が氷の山で採集されている。赤西谷では黒田祐一氏が1exを1971-VII-11に採集報告されている。

以上の様に同地区に分布している222種の他、今後、採集出来る可能性のある種、又はすでに採集されているが未発表のある種等を参考までに記すことにする。ムナクボカミキリ、キジマトラカミキリ、タケトラカミキリ、ヨツズジトラカミキリ、カンボウトラカミキリ、エゾトラカミキリ、ズマルトラカミキリ、スギカミキリ、ムモンベニカミキリ、アカアシオアオカミキリ、テツイロヒメカミキリ、ヒゲナガヒメカミキリ、ナカネアメイロカミキリ、ワモンサビカミキリ、マルバネコブヒゲカミキリ、クワカミキリ、ホオノキトゲバカミキリ、ルリカミキリ、ソボリンゴカミキリ、ブロウニングカミキリ、クビアカモモトホソカミキリ、スネケブカヒロコバナカミキリ、ヨツボシシロオビゴマフカミキリ、キマダラヤマカミキリ、等であろう。

その他、過去に記録のあるヨコモンヒメハナはニセヨコモンヒメハナカミキリの誤りで(兵庫生物 Vol. 6, No. 3 で辻氏記載)あるので省略した。又、ムネアカヒメハナカミキリはキペリクロヒメハナカミキリの1型として扱った。同好諸氏の活躍を期待して、報文を終結する。

参考文献図鑑

- (1)高橋 匡(1980) 但馬地方昆虫目録(予報第3報) IRATSUME No.4
- (2)高橋寿郎(1961) 兵庫県のカミキリムシ類(第1報) 兵庫県生物学会 Vol. 4 No.2
- (3) 全上 (1964) 全上(第2報) 兵庫県生物学会 Vol. 4 No.5
- (4)辻 啓介(1972) 兵庫県氷ノ山のカミキリムシ 兵庫県生物学会 Vol. 6 No.3
- (5) 全上 (1972) 兵庫県のカミキリ 月刊むし No.10
- (6)黒田祐一(1972) 音水及び坂谷国有林のカミキリムシについて すずむし(倉敷昆虫同好会)108号
- (7)山地 治(1980) 赤西溪谷(兵庫県)のカミキリムシ三種の記録 すずむし(倉敷昆虫同好会)117号
- (8)辻啓介・遊磨正秀・畑中熙・森脇久芳(1972) 1972年度氷の山カミキリムシ採集記録 きべりはむし Vol.1 No.1-2
- (9)大倉幸彦・遊磨正秀(1974) 氷の山および赤西における天牛採集記録 きべりはむし III-1
- (10)きべりはむし IX-1 兵庫昆虫同好会(1981)
- (11)穂積俊文(1979) 都道府県別カミキリムシ科目録要覧I 昆虫と自然XIV(12)とXIV(13)
- (12)草間慶一(1973) 日本産カミキリムシの生態と分布一覽表 新しい昆虫採集案内III
- (13)愛媛県立博物館(1978) 愛媛県のカミキリムシ
- (14)北山昭・渡辺一雄(1980) 兵庫県鉢伏山におけるヒメビロウドカミキリの採集例 月刊むし No.109
- (15)大平廣士(1982) 兵庫県におけるフタスジカタビロハナカミキリの記録 月刊むし No.135
- (16)図説長野県のカミキリムシ 日本民俗資料館
- (17)小島圭三・林匡夫(1969) 原色日本昆虫生態図鑑I カミキリ編(保育社)
- (18)中根猛彦・大林一夫・野村鎮・黒沢良彦 原色昆虫大図鑑II 甲虫編(北隆館)
- (19)高橋寿郎(1981) 兵庫県産甲虫類に関する文献目録改訂版

- 図1. シコクヒメコブハナカミキリ
- 図2. カエデノヘリグロハナカミキリ
- 図3. クロサワヒメコバナネカミキリ
- 図4. トラフホソバナネカミキリ
- 図5. エゾナガヒゲカミキリ
- 図6. ゴイシモモトカミキリ
- 図7. ムネモンヤツボシカミキリ
- 図8. イツシキキモンカミキリ

(S.14:Osamu Kuroda 姫路市 )

